

Dit jaar heeft de oude duivin met haar (heel mooie) zoon 3x een nest gemaakt. Twee maal heeft een jong wel het ei rondom uitgepikt maar onbrak het aan de kracht om er uit te kruipen. Ik sluit niet uit dat inteelt hier mede debet aan is, maar het kan ook door de te volle voliere komen. Ik heb ze daarom maar aan J. Kaper (de beheerder van de volieres op de plantage) gegeven, waar ze nu in een hun passende ruimte kunnen verblijven.

### KANARIEPOKKEN KUNT U GELUKKIG VOORKOMEN

Kanariepokken is vaak een dodelijke ziekte. Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet. Maar gelukkig kunt U Uw vogels er tegen beschermen. En wel door te enten. Het is dit jaar weer mogelijk om via onze zustervereniging De Vogelvriend in Uithoorn entstof voor kanariepokken te bestellen. Dit jaar is de prijs fl 45,- per flacon. Dat is genoeg voor 50 a 60 vogels. U kunt de entstof tijdens de ledenbijeenkomst op 26 april bestellen bij mij onder gelijktijdige betaling van het verschuldigde bedrag. U kunt tot uiterlijk 15 mei nog bestellen. Op zaterdag 2 juni is de entstof dan in ons bezit. PS Telefonisch bestellen is niet mogelijk!

Henk Rens  
Otto van Reesweg 45  
4105 AB Culemborg.

### Catalogus direkt klaar!

Dit jaar hadden we het dan toch voor elkaar: toen om 7 uur op vrijdagavond de TT opende lagen de catalogussen voor elke inzender en bezoeker gereed. Dit hebben we enerzijds weten te bereiken dankzij de perfecte service van de firma's Wang (fotocopieren) en Jako (vergaren, nieten, vouwen en snijden en anderzijds door vanaf het begin van het TT-proces de computer te benutten. Daar de computers allang niet meer de onbekende toverdozen zijn van nog slechts enkele jaren terug zal ik hier proberen te schetsen hoe in grote lijnen dat proces is gegaan. Direkt na het inleveren van de inschrijfformulieren heb ik die op alfabetische volgorde gelegd en een lijst van inzenders gemaakt, met daarbij per inzender het aantal vogels. Dit geschiedde met een zgn spreadsheet (rekenblad) dat de mogelijkheid biedt om kolommen op te tellen. In dat model worden ook automatisch het inschrijfgeld en de ereprijzen opgeteld, omdat de penningmeester dat nodig heeft voor het berekenen van zijn totaal prijzenbedrag. Op pagina 24 van de catalogus ziet U een deel van dit spreadsheet afgedrukt. Vervolgens heb ik in een ander spreadsheet elke vogel apart ingevoerd. Naast de gegevens die in de catalogus staan afgedrukt ringnr, soort, inzender wordt de klasse ingevuld. Verder bevat dit spreadsheet kolommen voor de verschillende onderdelen waarop de keurmeester de vogel beoordeeld (zie het keurbriefje). Dit spreadsheet telt de verschillende kolommen automatisch bij elkaar en, bij de kleurkanaries, ook nog eens apart de kleurpunten.

Nadat elke vogel is ingevoerd, hetgeen iets minder dan twee uur in beslag neemt bij ruim 300 vogels, laat ik de computer de vogels op klasse uitsorteren.

Ik heb dan al een ruw idee hoe groot de verschillende klassen moeten worden.

Bij minder dan 25 vogels in een klas is er geen probleem. Bij grotere klassen moet ik splitsen, zoveel mogelijk in gelijke groepen. Door de vogels binnen een klas op soort of kleur te laten sorteren, is makkelijk te zien waar de knip moet komen.

Als de klassen zijn bepaald, kan ik met een druk op de knop de klassenummers in opeenvolgende kooinummers laten wijzigen. Daarna sorteert ik de vogels weer op naam van de inzenders uit en kan de lijst met kooinummers per inzender afgedrukt worden.

Aan de hand van deze lijst worden de kooinummers uitgeschreven en verdeeld. Op de avond voor de TT worden op een duplicaat van deze kooilijst de veranderde ringnummers, kleurslagen of soorten aangetekend en nog in het grote spreadsheet verwerkt.

Ook wordt aan de hand van de klasse indeling in weer een ander rekenblad een schematische opstelling gemaakt waarop precies is te zien hoe de ruim 300 kooien in de stellingen moeten worden geplaatst. Hierbij wordt zo mogelijk rekening gehouden met de vorm van de verschillende kooien.

De volgende morgen wordt in de keurzaal zelf de computer met printer geplaatst. Het eerste werk, en tevens een controle op het goed functioneren, is het afdrucken van de "blinde keurmeesterslijst". Deze lijst bevat de exacte kooinrs, ringnrs en kleuren of soorten van de te

## Vogels voeren

In theorie en... in de praktijk

Toen ik op 1 juli van dit jaar precies 100 vogels "op zaad" had en al de verschillende bussen en potten met vogelvoer zag heb ik me afgevraagd of ik niet kon berekenen hoe het "ideale" zaadmengsel voor mijn vogelbevolking er uit zou moeten zien. 100 vogels rekt nog al makkelijk, ik heb een computer, dus zo'n berekening zou een peuleschil zijn, dacht ik.

Mijn uitgangspositie was de volgende:

Aantal	Soort vogel	Soort mengsel
30	Zebravinken+amadines	Tropenmengsel
23	Nonnen en Jap.meeuwen	Tropenmengsel
20	Kwartels en duifjes	Parkietenmengsel
1	Splendidparkiet	Park.mengsel extra
12	kanaries en wildzang	Kanariemengsel
4	Mozambiquesijsjes	Kanarie+tropenmengsel
10	Afrikaanse astrildes	Tropenmengsel extra

Zoals U weet is "tropenzaad" niet een graansoort, maar een mengeling van vele verschillende soorten. Deze mengeling varieert ook, afhankelijk van het seizoen en de prijs van de verschillende componenten

Het zelfde geldt voor de andere mengsels. De samenstelling staat (meestal) niet op de verpakking.

Ik ben daarom voor mijn berekeningen gemakshalve maar uitgegaan van de lijsten, zoals we die begin 1987 van onze spreker over vogelvoerders hebben gekregen en van opgaven uit de literatuur over wat voor een bepaalde vogelsoort het zaadmengsel behoort te zijn.

Ik heb daarna het aantal vogels vermenigvuldigd met hun ideale mengeling en dat weer gedeeld door 100.

Zo kreeg ik in procenten mijn ideale mix:

## H. De organisatie

Doordat voertingen alleen te krijgen zijn bij de erkende Vogelverenigingen, zullen de kwekers zich bij deze bonden aan moeten sluiten. Dat acht ik ook terecht omdat nu ook de niet-georganiseerde kwekers profiteren van de kennis en ervaring van de georganiseerde kwekers, die via de bonden over Nederland wordt verspreid.

Dit houdt niet in dat iedereen die (van) vogels houdt verplicht lid moet worden van de Bond. Voor een geringde vogel voor kooi en voliere kunnen zij echter alleen maar bij de georganiseerde kwekers terecht.

Dit waren mijn overwegingen. Er zal natuurlijk een soort overgangsregeling moeten komen om te voorkomen dat je anders je ongeringde vogels, die je nu bezit, op een gegeven moment moet laten vliegen.

Een regeling zoals hierboven beschreven is geen utopie. Voor zover mij bekend geldt zo'n regeling al voor de Nederlandse Postduivenhouders: zij mogen geen ongeringde duiven in hun hokken hebben.

Van de niet zelfgeringde duiven moeten zij een "eigendomsbewijs" overleggen. Dat is een kaartje dat o.m. het Ringnummer en de naam van de kweker vermeld.

Een regeling zoals ik die voorsta heeft ongetwijfeld ook zijn nadelen. Ik zou daarover dan ook graag, liefst een keer in verenigingsverband, met U van gedachten willen wisselen. Maar ik persoonlijk ben van mening dat we die bezwaren, die hoofdzakelijk de korte termijn betreffen, moeten overwinnen om niet op de wat langere termijn onze mooie hobby ernstig bedreigd te zien worden.

Het is daarenboven beter zelf met regels te komen, dan te wachten tot we die van hogerhand opgelegd krijgen. Want dan zou het aantal vogels dat in kooi en voliere mag worden gehouden weleens uiterst beperkt kunnen zijn. H. Rens

keuren vogels. De naam van de inzender of enige andere aanduiding waaruit de keurmeester de inzender zou kunnen afleiden is op die lijst taboe.

De voordragers kunnen met een soortgelijke lijst de te keuren vogels op tijd uit de stellingen halen en bij de keurmeesters op tafel plaatsen.

Tijdens het keuren worden niet alleen de totaalpunten per vogel van de keurbriefjes in het spreadsheet opgenomen, maar ook de onderverdeling per gezichtspunt. Een foutieve totaalstelling wordt zo direkt opgemerkt.

Direkt nadat een gehele groep is beoordeeld kunnen de prijzen aan de hand van de behaalde punten worden toegewezen door de TT-secretaris.

Ook kan (hoewel daar geen gebruik van is gemaakt) binnen een bepaalde groep alle 90 punten vogels worden gesorteerd, die voor het aanwijzen van de kampioen nog eens op de keurtafel moeten komen.

Ook de toegekende prijzen worden in het spreadsheet vermeld.

Nadat alle prijzen zijn toegewezen is het half vier en wordt het tekstgedeelte van de catalogus in het geheugen van de computer gelezen. In het tekstgedeelte is van te voren al de verwijzing naar de verschillende delen van het spreadsheet opgenomen, zodat direkt na het inlezen, de catalogus volledig op het scherm verschijnt.

Vervolgens wordt de gehele catalogus afgedrukt.

Dan begint het echte handwerk: aan de hand van een Van tevoren al klaar gemaakte "dummy" worden de bladen paarsgewijs aan elkaar geplakt 24 naast 1, 2 naast 23

enzv, zodat de hele zaak gecopieerd kan worden.  
Om even na half vijf vertrekken we naar de firma Wang.

Enkele tekstpagina's en alle advertenties waren van tevoren al gecopieerd, maar toch moesten nog 20 pagina's tekst (5 vellen papier dubbelzijdig) worden gecopieerd  
Om kwart voor zes stonden we Jako op de stoep.

Daar werd door het verrijden van enkele grote pallets de vergaarmachine voor ons vrijgemaakt. De 6 vellen met tekst en de 4 vellen met advertenties werden er in geplaatst op zodanige wijze dat we nooit 2 bladen met advertenties na elkaar kregen en de zaak werd mechanisch geraapt.

Vervolgens werden de 200 exemplaren geniet en gevouwen. Het waren al catalogussen van een veel betere kwaliteit als je meestal op TT's krijg maar volgens de directeur van Jako nog niet goed genoeg. De boekjes werden netjes schoon (alle uitstekende papierrandjes eraf) gesneden en met een kracht van ruim 3 ton in hun model gedrukt.

Ondertussen waren de keurbriefjes al per inzender bij elkaar gezocht. Toen kwam de computer die dag voor de laatste maal in aktie. Via een zgn "mail-merge" (post verzend) programma heb ik voor elke inzender een etiket gedrukt, dat we op de catalogus plakten, waarin ook zijn keurbriefjes waren opgeborgen. Om klokslag zeven konden de inzenders kennis nemen van hun resultaten en die van de overigen.

Nadat de computer weer thuis stond opgesteld, de vogels waren gevoerd en ik ook had gegeten, heb ik nog van elk kooinummers apart een "kaartje" in een data-base (een elektronische kaartenbak) opgenomen.

#### D. Welzijn

Ook als dierenliefhebber zouden we tegen de vogelimporten moeten zijn. Bij het onder C geschetste traject gaat het er niet om, om alle vogels levend en wel op hun eindbestemming te krijgen. Het gaat er om dat zoveel vogels de eindbestemming halen dat het het meeste profijt oplevert. Of er nu 101.000 of 200.000 vogels moeten worden gevangen in hun biotoop om er uiteindelijk 100.000 bij de Nederlandse groothandel te krijgen doet daarbij nauwelijks terzake.

#### E. Het stimuleert het bewuster vogelhouden.

De doodoener dat, als we geen gebruik meer van de import kunnen maken, de hobby ten dode opgeschreven is, staaf ik niet. Er mag bv uit Australie geen prachtvink of parkietensoort meer worden geëxporteerd. Dat zijn nu juist de meest gekweekte soorten geworden. Alleen Nederland exporteert nu jaarlijks al meer zebra-vinken en grasparkieten als Australie in zijn glorie-tijd ooit heeft gedaan.

#### F. De variatie

Doordat van elke vogel, via zijn voeding, de kweker en (naar je mag aannemen) zijn afstamming bekend is kan bij het optreden van mutaties veel sneller en gericht te werk worden gegaan zodat binnen de nu al gehouden soorten velerlei kleurslagen kunnen ontstaan.

#### G. De prijs

De prijsopdruk, die in het begin op de eigen kweek vogels zal ontstaan, zal wellicht snel wegebben. Indien men er in slaagt om een soort in voldoende mate te kweken geldt al gauw de wet van vraag en aanbod. De "opfokkosten" spelen daarin niet of nauwelijks een rol (zie bv Zebra-vinken).

#### A. Geen gesjoemel

Het voorkomt de gedwongen konstrukties zoals we die nu rond de wildzang kennen. Je mag geen ongeringde vogel vervoeren, verhandelen of tentoonstellen, maar je mag hem wel bezitten. Voorzover ik heb kunnen nagaan bezit het merendeel van onze leden wel een of meer wildzang vogels. Daar zitten echter heel weinig EK-vogels tussen.

#### B. Milieu-bescherming.

Het is een illusie te denken dat nog langer ongestoord door kan worden gegaan met het importeren van in het wild gevangen exotische vogels. Alleen al in Nederland worden jaarlijks meer dan honderd duizend van die vogels ingevoerd. Het in die enorme getallen wegvangen van vogels zal of door de thuislanden van die vogels worden verboden of de vogels worden zo zeldzaam dat het vangen niet meer loont.

#### C. Het stimuleert het zelf kweken van vogels.

Indien je op grond van economische motieven vogels zou willen houden, kan je beter stoppen. De kosten die het in de voliere met levend voer opfokken van een jonge vogel met zich meebrengt staan in geen enkele verhouding tot de prijs die je voor een in het wildgevangen vogel neer moet tellen. Een zelfgekweekte Europese sijs heeft, op het moment dat hij succesvol door zijn jeugdruï is gekomen, alleen aan zijn eigen voedsel al gauw zo'n 40 gulden gekost. Voor een Blauwfazantje dat is gevangen, getransporteerd naar het vliegveld, overgevlogen uit Oost Afrika, in Nederland geïmporteerd en via de groot handel bij de dierenspeciaalzaak is gekomen betaal je als regel zo'n 15 gulden. Een nest met 4 Blauwfazantjes in de voliere grootbrengen met Buffalo-wormpjes, universeelvoer en kleine maden kostte me 13 weken lang een tientje in de week extra. Zelfs als er geen jong sneuvelt is de kostprijs dus het dubbele.

Dat gaat trouwens ook met een druk op de knop.

Zo'n database is, veel meer nog dan het spreadsheet in staat om bij elkaar behorende gegevens te zoeken en te bewerken. Het TT-overzicht in cijfers en de 5-beste per inzender zijn op die manier ook binnen een uur gemaakt.

Als laatste gebruiken we de computer nog voor de prijs uitreiking. Netjes zoekt hij voor ons bij elkaar wie welke prijs heeft gewonnen, hoeveel prijzen dat in totaal zijn en wat elke prijs mag kosten.

Min of meer los van de TT wordt de computer ook nog gebruikt voor het maken van persberichten en stukjes zoals deze. Maar dan is het niet meer dan een luxe schrijfmachine, waarin zijn specifieke vaardigheden nauwelijks worden benut.

Indien U echt geïnteresseerd bent hoe alles werkt ben ik bereid om daar thuis tekst en uitleg over te geven. Liefst wel even van te voren bellen, want een uurtje "computeren" is niks.

Overigens is onderstaande grafiek, die de onderlinge verschuiving in de verhouding tussen achtereenvolgens zangkleur,tropen,postuur en parkieten vanaf 1982 tot heden weergeeft, met hetzelfde programma gemaakt.

Zo werd de Grasparkiet huisdier.

Wilde grasparkieten komen voor in Australië. Ze leven er in grote groepen, die altijd in beweging zijn en een oorverdovend kabaal maken.

Een prachtig gezicht, die honderden groengele vogels tegen de strakblauwe hemel. Soms zijn er zoveel dat ze, als ze allemaal tegelijk opvliegen, de zon verduisteren

De oorspronkelijke bewoners van Australië hadden veel plezier in deze bonte vrolijke diertjes. Door de vogels te lokken met voer wisten ze ze tam te maken.

Uiteindelijk kwamen ze uit hun hand eten. Dit werd gezien door Europese zeevaarders, kooplieden en geleerden en een van hen nam in 1840 een paartje parkieten mee naar huis.

In Engeland baarden de vogels groot opzien en al vlug werd de parkiet net zo populair als de kanarie.

En net zo kostbaar. Fabelachtige prijzen werden voor de vogels betaald. Binnen de korst mogelijke tijd werden wilde parkieten met duizenden naar Europa verscheept. Tot de mensen ze hier zelf leerden kweken en zelfs allerlei kleurslagen wisten te krijgen: blauw wit roze en geel.

De grasparkiet is lid van de papagaaienfamilie.

Dit is goed te zien aan zijn papagaai-oogjes, zijn haaksnavel - waarmee hij zijn zaden pelt, maar zich ook vasthoudt bij het klimmen - en aan zijn pootjes, die twee tenen voor en twee tenen achter hebben.

Daaraan heeft hij, precies zoals in Holland de spechten, goed houvast bij het klauteren langs takken en boomstammen.

Net als de overige soortgenoten van de papagaaienfamilie is de parkiet bijzonder intelligent.

Hij kan allerlei kunstjes onder de knie krijgen en hij

Als we het over de tentoonstelling hebben komt de achterstand te sprake die de "koude" kwekers hebben ten opzichte van de "warme" kwekers, die al in januari beginnen en er nu al 2 ronden op hebben zitten. Die jongen zijn op de TT 3 maanden ouder.

Toch slaagde Kuyer er de afgelopen TT in om de mooiste border op de stelling te brengen.

Een border, die hij nu zelf in de broedkooi heeft zitten en waar zijn hoop voor dit seizoen dan ook op is gevestigd.

Voor de toekomst hoeft hij zich voorlopig dan ook geen zorgen te maken vooral niet omdat zijn zoon een bijna even fanatieke vogelliefhebber is als zijn beide ouders. Voor hij 'smorgens naar school gaat loopt hij alle kooien na en houdt nauwkeurig de kweekadministratie bij. Hij weet dan ook vaak eerder als zijn vader hoeveel jongen er zijn geboren. Wij wensen de familie dan ook veel succes.

### **"Eigen kweek"**

Nu het zich laat aanzien dat de beruchte Vogelwet van 1936 binnenkort niet langer meer van kracht zal zijn, heb ik geprobeerd me eens wat dieper in die kant van het vogelhouden te verdiepen. Laat ik hier meteen heel duidelijk in zijn: het is mijn prive-mening. Die staat geheel los van de mening die onze bond in het overleg met Minister Braks ventileert om te proberen een voor de Nederlandse Vogelhouders zo gunstig mogelijke regeling te treffen.

Naar mijn mening zullen wij, als georganiseerde vogelhouders en -kwekers er naar moeten streven dat er in de Nederlandse volieres alleen nog maar vogels voor mogen komen, die zijn voorzien van een vaste voeding: dus eigen kweek vogels. Vogels voorzien van zo'n vaste voeding moeten dan wel vrijelijk tentoongesteld, vervoerd en verhandeld mogen worden. De reden hiervoor zijn:

tijdens de broedtijd wordt afgescheiden voor de kweek van zijn bourksparkieten.

Hij heeft vier broedstellen zitten, twee in de gedeelde grote vlucht, een in de kleine vlucht en een in de kweekruimte.

Het eerste stel heeft twee jongen, het tweede zit op 6 bevruchte eieren, het derde doet nog niet zo veel en van het laatste stel is de pop duidelijk aan het kwakkelijken. Hij hoopt de pop te kunnen behouden.

In de grote voliere zitten verder nog een stel japanse nachtegalen, een putter, een mozambiquesys en twee in overdadige konditie verkerende waterslager poppen. Die laatste zijn bedoeld voor de bastaardkweek met de putter.

Op de bodem scharrelen in beide volieres ook nog een stelletje chinese dwergkwarteltjes rond. Een van die stellen is net begonnen met een nestje in de hoek van de voliere in een houten kistje met hooi.

Opvallend punt in beide volieres is dat het bodem zand niet vlak is maar in een grote hoop tegen de achterwand is opgeworpen. Zo kunnen de vogels ook vanuit de huiskamer goed gezien worden.

Ook in zijn broedkooien gebruikt hij gewoon schoon zand uit de put van Hussen.

Het wordt bijna dagelijks gezeefd en gereinigd.

Het voer in de volieres bestaat uit een mengeling van parkietenzaad met het overschot uit de broed- kooien. Hoewel de nachtegalen dus geen universeel- voer krijgen is hen dat niet aan te zien.

Wel duidelijk is dat de kanariepoppen zich liever te goed doen aan het energierijke parkietenvoer dan genoeg te nemen met het overschot van hun collega's binnen.

's Winters worden de buitenvolieres afgeschermd met glazen panelen. In de zomer gaat zowel als bescherming tegen de koele avonden als tegen de katten uit de buurt een hor van plastic voor de vluchten.

kan zelfs leren "praten".

Zoals hij zich in het wild heel sociaal gedraagt en geen moment buiten het gezelschap van anderen kan, zo zoekt hij in gevangenschap gezelligheid bij de mens.

Hij hecht zich sterk aan zijn verzorger en diens huisgenoten. Van lieverlee is de grasparkiet een echte mensenvogel geworden, die graag bijzijn baas is en niets liever doet dan met hem spelen.

Een echt huisdiertje dus.

Dit artikel van Theo Schildkamp komt uit De Boerderij

### **Culemborgse vogelkwekers oogsten nationale roem**

Tijdens de in Zutphen gehouden Tentoonstelling van de Algemene Bond van Vogelhouders zijn de vogels van drie Culemborgers in de prijzen gevallen.

Op dit nationaal kampioenschap, waar meer dan 10.000 vogels aanwezig waren, getuigt dit van grote klasse.

De zangvogels kwamen op de eigen show van de Eerste Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging helaas niet meer voor, maar de kwekers kunnen het nog wel! Harzerkweker Cor Brouwer behaalde op de Bondskapioen een derde prijs met zijn stam. Daarvoor sloeg hij op de onderlinge tentoonstelling in Utrecht ook al een geweldige slag: hij behaalde daar het algemeen kampioenschap en de titel meesterzanger!

Op de Bondskampioen bewees Bram van Velden ook over zeer goede vogels te beschikken. Zijn Gloster corona Cinamon behaalde daar eveneens een derde prijs. Dat hij er zeer goed in slaagt zijn vogels in conditie te houden blijkt wel uit het feit dat deze vogel ook deel uitmaakte van de stam waarmee hij zowel in Utrecht als in Culemborg een eerste prijs behaalde.

Ook Wim Elings toonde in Zutphen aan goed op zijn vogels te passen. De donkerbruine Japanse meeuw, waarmee hij het kampioenschap van de tropische vogels in Culemborg behaalde, was daar goed voor de derde prijs. Eerder was deze vogel op de gewestelijke wedstrijd van de provincies Noord-Holand en Utrecht in Nieuwegein al de hoogste gewaardeerde tropische vogel. Op dezelfde tentoonstelling slaagde Joop de Rooy erin een eerste prijs bij de kleurkanaries te behalen met een oranje rode vogel.

### **Postuurkanaries en parkieten**

Als op een zaterdagmiddag in april de redactie op bezoek wil gaan bij een aantal kwekers om daar video-opnamen te maken, zit het geluk niet mee. De camera laat het afweten.

Maar dat belet ons niet om op het eerst afgesproken adres, bij de familie Kuyer aan de Emmalaan op bezoek te gaan.

Het vogels houden is daar niet alleen een hobby van de heer des huizes: de hele familie is bij de verzorging en kweek van de vogels betrokken.

In de onverwarmde schuur, waar 's avonds ook de fietsen moeten staan zitten 11 kanarie-poppen in zelfgemaakte broedkooien.

Onder de broedkooien zitten twee vluchtjes voor de jonge vogels en de overtollige mannen. Hoewel er drie mannen in dat vluchtje zitten op het moment dat wij er zijn, heeft hij er eigenlijk 1 tekort. Het liefst laat Kuyer de mannen bij de poppen zitten, alleen als ze te druk zijn haalt hij ze weg.

Wat mij opvalt is dat hij bijna uitsluitend overjarige mannen voor de kweek heeft ingezet. De 7 borders en 3 glosters zijn half maart al samen met de mannen opgekooid. Precies op 1 april (systeem Hendriksen?) gaan de nestjes erin. Dat de kanaries geen minuut verloren hebben laten gaan blijkt wel, er zijn al 5 nesten uit met in totaal 18 jongen.

In de 11e kooi zit een kanarie-pop met een putter op 6 eitjes te broeden. Er is dus hoop op een aantal bastaarden.

Omdat hij pas op 1 april begint worden er maar twee ronde gebroed. Vorig jaar kwamen er toch uit die 2 rondes 55 jongen uit 11 poppen. Niet slecht, vindt hij zelf. Zijn vrouw, die ook erg veel tijd en aandacht aan de vogels geeft vindt het ook meer dan genoeg. "Je komt anders aan je andere werk niet toe" vindt ze.

De jongen gaan uit de broedkooien in de jeugdvluchten en daarna naar buiten.

Daar staan twee volieres, waarvan een deel van de grootste



70 Witborst bruin \* pop  
71 Witborst bruinpastel \* man  
72 Witborst bruinpastel \* pop  
73 Oranjeborst bruin man  
74 Oranjeborst bruin pop  
75 Oranjeborst zwartborst br man  
76 Oranjeborst zwartborst br pop  
77 bruinwang man  
78 bruinwang pop  
79 Bruinbont man  
80 Bruinbont pop  
81 bruingetekende man  
82 bruingetekende pop  
83 Wit man  
84 Wit pop

grijspastel = dominant zilver  
bruinpastel = dominant bruin  
witborst grijs = grijsvleugel  
witborst bruin = bruinvleugel  
witborst bruinpastel = cremevleugel  
witborst grijspastel = zilervleugel  
Grijze bleekrug pastel = dominant zilver bleekrug  
bruine bleekrug pastel = dominant creme bleekrug

Frans Stap tenslotte behaalde op deze gewestelijke wedstrijd een 3e prijs met een lutino Agapornis Rosseicolli.

Uit deze prestaties blijkt duidelijk dat de ECKEV, jarenlang een vereniging van bijna uitsluitend zangkanariekwekers, is uitgegroeid tot een all round vogelvereniging waarvan de vogels zich met succes kunnen meten met de beste van Nederland.

H. Rens

Van de vereniging:

\*We zijn aangesloten bij de Algemene Bond van Vogelhouders. De leden ontvangen elke maand het blad "Vogelvreugd" met informatie over vogels en hun verzorging.

\*Er wordt in principe 1x per maand vergaderd, behalve in de zomermaanden.

De tweede helft van deze vergadering wordt besteed aan de praktische kweek. Daar worden dus ook Uw vragen en problemen behandeld.

\*Ongeveer 4x per jaar verschijnt het Verenigingsblad.

In dat blad schrijven leden over hun ervaringen met en hun opvattingen over de vogels waarmee zij kweken.

Het blad wordt daarnaast gebruikt voor bestuursberichten.

\*De contributie bedraagt 45,- per jaar en is bij vooruitbetaling te voldoen, eventueel per half jaar.

Nieuwe leden betalen een entreegeld van 3,50.

\*Een van de regels van de vereniging is dat het lidmaatschap automatisch wordt beëindigd als de contributie niet per 1 januari of per 1 juli door de penningmeester is ontvangen.

\*Het gironummer van de penningmeester is: 3980719 op naam van de penningmeester M. Verlangen.

Vermeld bij het overmaken:

Kan. Vereniging contributie.

\*Het postadres van de Eerste Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging is:

Secretaris ECKEV  
M.A. van Soelen  
Honingklaver 13  
4102 JT Culemborg  
Tel. 03450-16073

38 Oranjeborst zwartborst gr pop

39 Oranjeborst phaeo man

40 Oranjeborst phaeo pop

41 Grijze Isabel man

42 Grijze Isabel pop

43 Grijswang man

44 Grijswang pop

45 Grijsbont man

46 Grijsbont pop

47 Grijsgetekende man

48 Grijsgetekende pop

#### Bruinserie

no Omschrijving M/V

49 Normaal bruin man

50 Normaal bruin pop

51 bruine bleekrug man

52 bruine bleekrug pop

53 bruinmasker man

54 bruinmasker pop

55 Zwartborst bruin man

56 Zwartborst bruin pop

57 Zwartborst bruinebleekrug man

58 Zwartborst bruinebleekrug pop

59 Zwartborst bruinmasker man

60 Zwartborst bruinmasker pop

61 Zwartborst bruinpastel man

62 Zwartborst bruinpastel pop

63 Zwartborst witborst bruin man

64 Zwartborst witborst bruin pop

65 Bruinpastel \* man

66 Bruinpastel \* pop

67 bruine bleekrug pastel man

68 bruine bleekrug pastel pop

69 Witborst bruin \* man

4 Grijs bleekrug        pop  
 5 Zwartmasker        man  
 6 Zwartmasker        pop  
 7 Zwartborst grijs    man  
 8 Zwartborst grijs    pop  
 9 Zwartborst gryze bleekrug man  
 10 Zwartborst gryze bleekrug pop  
 11 Zwartborst zwartmasker man  
 12 Zwartborst zwartmasker pop  
 13 Zwartborst grijspastel man  
 14 Zwartborst grijspastel pop  
 15 Zwartborst witborst grijs man  
 16 Zwartborst witborst grijs pop  
 17 Phaeo                man  
 18 Phaeo                pop  
 19 Grijspastel        \* man  
 20 Grijspastel        \* pop  
 21 Grijs bleekrug pastel man  
 22 Grijs bleekrug pastel pop  
 23 Witborst grijs     \* man  
 24 Witborst grijs     \* pop  
 25 Witborst grijspastel \* man  
 26 Witborst grijspastel \* pop  
 27 Roodflank            man  
 28 Roodflank            pop  
 29 Oranjeborst grijs    man  
 30 Oranjeborst grijs    pop  
 31 Oranjeborst bleekrug man  
 32 Oranjeborst bleekrug pop  
 33 Oranjeborst masker    man  
 34 Oranjeborst masker    pop  
 35 Oranjeborst isabel    man  
 36 Oranjeborst isabel    pop  
 37 Oranjeborst zwartborst gr man

## Onze aanstaande tentoonstelling

Mij is gevraagd eens iets te schrijven over het klaar maken van de kleurkanaries voor de a.s. tentoonstelling en wedstrijd daar aan verbonden.

De geroutineerde kwekers zal ik niets nieuws vertellen al doet iedereen het zo'n beetje op zijn eigen manier.

Hopelijk hebben we allemaal een hok vol mooie, jonge vogels, die nu al bijna alle zijn afgeruid. Veel badwater en wat extra licht doet verder de rest.

In september hebben we de vogels al eens nagekeken en een kapotte slagpen van vleugel of staart verwijderd.

Die groeit vanzelf weer aan. Je ziet dus dat het in conditie brengen al vroeg begint. In dit geval een van de belangrijkste onderdelen van de kleurkanarie:

de bevedering.

De voornaamste is natuurlijk de kleur, maar je zult het met me eens zijn, dat hoe mooi een vogel ook van kleur is en zijn bevedering is niet glad, of hij mist vleugel- of staartpenen, U een goed resultaat op de TT wel kunt vergeten.

Elk onderdeelje van de puntenlijst (en dat zijn er 7) verdient dan ook de nodige aandacht.

Om het niet te lang te maken zal ik voorlopig de kleur onderverdeeld in pigment en bijtint, overslaan en alleen de andere eisen aanhalen.

Dat zijn: houding

grootte

vorm

bevedering en

conditie

Allemaal even belangrijk, want 1 punt is veel, vooral bij ons op de vereniging, waar we heel knappe vogels hebben, die niet veel voor elkaar onderdoen.

De houding is op zich al moeilijk.  
Hoe rustiger een vogel hoe mooier.  
Nu beginnen we dus al met vooral geen vogels te vangen met het netje. Weet je wel, vangen, het net lekker in de ronddraaien, goed vastgrijpen en in de TT-kooi stoppen. -2-

Vergeet het maar! Die vogel is de eerste weken volledig het vertrouwen in zijn baas kwijt. Een beetje vogelkweker kan dat ook anders b.v. 's avonds vangen met de hand en gewoon voorzichtig. Die gekooide vogel voelt zich toch al niet zo lekker zo alleen. Met enkelen bij elkaar in een broedkooi gaat het al een stuk beter. Na een weekje mag hij dan in een TT-kooi.

Om nu de staart en de vleugelpennen niet te beschadigen, doe je een stukje plastic met enkele punaises voor de spijlen aan de buitenkant van de kooi.

De bovenzijde laat je open en daar leg je een stukje spiegelglas op. De vogel gaat op de bovenstok zitten en rekt zich om zijn soortgenoot goed te bekijken.

Zorg voor stevige, niet te dunne zitstokken, zodat ie er niet afglijdt.

Een week voor de TT haal je de hele handel er weer af, plastic en spiegel en dan maar veel die kooi in de hand nemen, allemaal rustig, heel rustig. De vogels wennen daaraan en hebben volledig vertrouwen in hun baas.

Hopelijk zijn de keurmeester en voordrager ook rustig natuurlijk.

De grootte van de vogel is in zo verre belangrijk dat het ene soort wat forser is dan de andere, maar dat we zeker niet kleiner mogen dan  $\pm 13$  cm.

Om het geheel nog wat ingewikkelder te maken benoemen de NBvV en onze bond verschillende kleuren anders. Zo heet "onze" grijsvleugel bij mijn NBvV- buurman opeens "witborst grijs".

Het is natuurlijk ondoenlijk om alle standardeisen op te nemen. Ik heb daarom aan de hand van de standardeisen van onze bond en - als wij ze niet hebben - die van de NBvV, een overzicht gemaakt van de meest in het ooglopende kenmerken van de zebravink mannen en poppen.

Wat voor alle kleuren geldt is het volgende:

De ogen moeten donker zijn en de poten oranjerood.

Bij de roodsnaveligen moet de snavel van de man koraalrood zijn, die van de pop oranjerood.

Bij de geelsnaveligen is dat donkergeel voor de man en lichtgeel voor de pop.

Een zebravink moet een forse indruk geven en inclusief de staartpennen minimaal 10,5 cm lang zijn.

Om U een goed oordeel te kunnen vormen is het handig om te weten dat als de vogel onder een hoek van  $45^\circ$  in de universele TT-kooi op zijn zitstok zit (zoals is voorgeschreven) het overeenstemt met de afstand tussen 7 tralies van het voorfront. Ligt de zebravink als het ware plat op zijn stokje dan dienen dat 10 tralies te zijn.

Een zebravink is een geblokt type vogel en moet een robuuste gestalte bezitten.

no Omschrijving  Grijsserie  M/V

1 Normaal grijs man

2 Normaal grijs pop

3 Grijs bleekrug man

waarvan de lettercode na de registratie was gewijzigd. Zowel de jonge vogels als de onjuist getatoueerde vogels werden in beslaggenomen en overgebracht naar de Diergaarde Blijdorp.

De vogelhandel werd op grond van de Wet Bedreigde Uitheimse Diersoorten veroordeeld tot een boete van f 50.000, waarvan de helft voorwaardelijk. De beide eigenaren van de ara's kregen ieder een boete van f 25.000 waarvan eveneens de helft voorwaardelijk.

De hoge boetes die zijn opgelegd (er was overigens het dubbele geeist) tonen aan dat Nederland hecht aan de bestrijding van illegale praktijken met zeldzame planten en dieren.

Geruchten dat bovengenoemd geval, dat onder meer in het blad van het Wereldnatuurfonds stond gepubliceerd, zou gaan over de vorig jaar bij Sielhorst in beslag genomen vogels, zijn niet juist. Dat betrof de veel minder zeldzame en kostbare geel schouderara. Deze zaak zal op 2 juni voorkomen.

### **Zebravinken**

Het is niet mijn bedoeling om uitgebreid over de kweek en verzorging van deze veel gehouden en gekweekte vogel te schrijven.

Dat heeft G.W. van der Meyden in 1987 in ons bondsblad Vogelvreugd al voor zijn rekening genomen.

Wel wil ik Uw aandacht vragen voor de naamgeving en de determinatie (wat voor kleurslag) van deze vogel De NBvV erkent op dit moment in zijn vraagprogramma voor de tentoonstellingen zo'n 42 benoemde en nog 6 onbenoemde kleurslagen w.o. de "agaat"

Als U dan ook nog bedenkt dat al deze 42 kleuren zo wel met een rode als met een gele snavel worden gevraagd en ook nog eens met en zonder kuif dan komt U tot ca 170 verschillende categorieën, die U in de TT kooien en dus ook in de handel aan kunt treffen

En dat begint al in de kweekkooi.

Van te kleine ouders kun je moeilijk grote vogels verwachten. Over het algemeen is dat voor onze leden geen probleem.

De vorm is geheel aan jezelf. Een vogel die te vet is en een hangborst vertoont heeft te veel gegeten, nietwaar? Gewoon op dieet zetten. Te kleine vluchten geven ook vaak dat probleem te zien. Zo'n vogel moet goed uit kunnen vliegen.

Er zijn natuurlijk ook soorten die er heel vatbaar voor zijn, zoals de isabellen. Ook hebben de poppen er het meest last van en als TT-vogel geldt dit eigenlijk alleen de pop van de isabel.

Van de bevedering heb ik al iets gezegd en nogmaals, let goed op de staartveren, geen kale of geschonden plekjes. Niet te lange bevedering, vooral niet onder de flanken en op de rug.

Bij niet intensieve vogels komt dit veel voor. Intensieven hebben een veel kortere bevedering met als risico een niet gesloten bevedering op de borst.

Conditie wordt het laagst gewaardeerd, maar ook hier kost 1 punt veel, vooral als die vogel in een stam zit.

Het gaat in hoofdzaak om een schoon gevederte, zonder rafeling of vuil, een gezond uiterlijk, niet te lange nagels of, nog erger, ontbrekende nagels.

Al met al is het een hele zorg om de vogels goed voor te bereiden.

Natuurlijk wordt er ook gezorgd voor een mooie, schone kooi, schone zitstokken, die goed vastzitten en niet te weinig bodembedekking.

Heren, veel succes op de aanstaande tentoonstelling!

Volgende keer schrijf ik wat over de kleur.

Chr. Verheyde

### **De tentoonstellingskooi**

Alle vogelliefhebbers kennen ze wel, de universele TT-kooien waarin de kleurkanaries, de kleine tropen, de grasparkieten, de apponorgissen en de meeste postuurkanaries in worden tentoongesteld.

Deze kooien geven niet alleen een tentoonstelling een goed verzorgd en strak uiterlijk maar moeten ook zelf aan strak omschreven eisen voldoen. Dat is om te voorkomen dat de kooi invloed heeft op de beoordeling door de keurmeester: in een kleine kooi b.v. lijkt een vogel al gauw wat forser.

Op de maten en afmetingen van de TT-kooi ga ik hier niet in. Deze zijn alleen van belang als je ze zelf wilt bouwen en in dat geval heb ik goede bouwtekeningen voor U klaarliggen.

Toch is niet uit te sluiten dat naast het uiterlijk van de vogels (waarover Chr. Verheyde een mooi stuk over heeft geschreven) ook het uiterlijk van de kooi mee kan spelen. Een smerige, gehavende TT-kooi met een roestig voorfront zal nimmer een positieve invloed op de waardering door de keurmeester hebben.

Besteed daarom ook aandacht aan de kooien en dat liefst ruim voor de TT. Als U de vogels na de TT uit kooit heeft U natuurlijk de kooien al van zand, water en zaad ontdaan en schoongemaakt. Maak ze nu weer schoon, waarbij een ontsmettingsmiddel als Halamid of U2 geen kwaad kan. Controleer de kooien op de bevestiging van het voorfront, kijk of de zitstokken goed vastzitten en ga na of het sluitmechanisme in het deurtje nog goed werkt. Als de vogel er al in zit, is dat te laat.

gewoon meedoen met de eigen kweek vogels.

Ons eigen clubblad vindt hij wel leuk. Ondanks herhaald aandringen heeft hij echter nog niet de moed op kunnen brengen om zelf de pen eens ter hand te nemen, om een stukje voor dit blad te schrijven.

Misschien dat dit stukje hem er nu toe noopt.

Ik heb in ieder geval daar veel geleerd.

H. Rens.

### **DNA-onderzoek tegen illegale vogelhandel**

De Algemene Inspektie Dienst van het Ministerie van Landbouw en visserij gaf een in DNA-onderzoek gespecialiseerd bedrijf in Engeland opdracht tot het onderzoeken van het genetisch materiaal uit het bloed van drie jonge zeldzame hyacintara's.

De hyacintara staat te boek als een ernstig bedreigde diersoort. In de natuur komen er nog maar 2000 tot 5000 voor.

In Nederland is de vogel sinds 1977 beschermd. Vorig jaar is de hyacintara ook opgenomen op de lijst van diersoorten, die vallen onder de strengste regels van de bedreigde uitheemse diersoorten.

De handelswaarde van de hyacintara, die 15.000 tot 20.000 gulden per vogel bedraagt, vormt de ernstige bedreiging voor deze soort.

Volgens de kweker, een Nederlandse Vogelhandel zouden de onderzochte jongen eigen kweekvogels zijn. Uit het DNA-onderzoek bleek echter onomstotelijk dat de jonge vogel erfelijk materiaal bezaten dat nog van de vermeende moeder, nog van de vermeende vader afkomstig kon zijn. Vermoedelijk gaat het om vanuit Zuid-Amerika binnengesmokkelde en hier uitgebroede eieren of als zeer jonge vogels gesmokkelde exemplaren.

Bij dezelfde vogelhandelaar werden bovendien twee volwassen hyacintara's aangetroffen met een registratietatouage,

kalender waarop de kweekadministratie wordt bijgehouden. Zijn jonge en oude vogels krijgen groenvoer en het standaard parkietenmengsel van Voskes. Van de andere bekende zaadmengsels is hij niet zo onder de indruk.

Het verzorgen van de vogels is niet alleen een taak van Frans zelf, ook zijn vrouw en dochter helpen mee. Zijn vrouw voert bv elke dag de vogels (waar heb ik dat toch meer gehoord?) en zorgt er ook aan het begin van het TT-seizoen voor dat alle 30 kooitjes weer keurig schoon en helder gewit klaar staan. Opkooien voor een TT wordt niet gedaan. De vogels zijn van zichzelf nog al rustig en bovendien zijn ze in staat in 1 week hun kooi grondig te verbouwen. De ringen van de waterfontijntjes moeten het bij ons op de TT in ieder geval altijd ontgelden.

Op de TT is Frans zeer succesvol. Naast vele malen in Culemborg is hij ook kampioen in Eck en Wiel en in Tiel geweest. Zijn enorm grote prijzenkast puilt dan ook bijna uit.

Toch is Frans, zoals bijna elke rechtgeaarde vogelhouder nog niet helemaal tevreden met de huisvesting. Deze zomer wil hij zijn vluchten veranderen: 6 vluchtjes van ca 75 cm breed en met gemetselde onderkanten wordt nu de nieuwe indeling. De zuid gevel krijgt ook een gemetselde voeting, waardoor ook het dak wat meer helling krijgt.

Het dak wil hij overigens ook vernieuwen.

Ook wil hij, als hij de kans krijgt, in huis wat meer met tropen gaan doen. Dat zal, als ik de geluiden van zijn achterban goed heb begrepen, nog wel even op zich laten wachten.

Door zijn voorliefde voor tropen en parkieten leest Frans Stap liever "Onze vogels" het blad van de NBvV als ons eigen Vogelvreugd. Hij zou er persoonlijk dan ook geen bezwaar tegen hebben als ECKEV zich bij "de andere" bond aan zou sluiten, ook al gezien zijn lidmaatschap in Eck en Wiel.

Daar mag hij overigens, tot zijn verbazing, met de AB-ringen

Is de verf van de kooi zodanig beschadigd dat het geheel een onverzorgde indruk gaat maken schilder dan de kooi compleet opnieuw: matzwart voor de buitenkant en matwit voor de binnenkant.

De zitstokken blijven blank.

Voor een goede aanblik beveel ik ook aan om de (witte) waterfonteintjes links in het voorfront te plaatsen en de (witte) voerbakjes rechts.

En wellicht ten overvloede: de oude, ondiepe kanariekooien zijn dit jaar niet meer te gebruiken. Ze vallen door de nieuwe stelling heen!

In het Tentoonstellingsreglement, dat aan alle inzenders ter beschikking is of wordt gesteld, staat bepaald dat de vogels moeten worden ingezonden in kooien die voldoen aan de bondsvoorschriften.

Dat houdt in:

zangkanaries                      de beukenhouten zangkooitjes  
Gefriseerde postuurkanaries in de koepelkooien  
kleur- en postuurkanaries      de universele TT-kooi  
Grasparkieten en agapornissen idem  
Tropen tot en met het formaat Roodkuifkardinaal idem

Voor de overige vogels is geen kooi voorgeschreven.

Voor de grote tropen en parkieten wordt de zgn. grote parkietenkooi aanbevolen.

Deze kooien, die qua uiterlijk doen denken aan de universeelkooi, zijn 50 cm breed en 40 cm hoog.

De vogels zitten hierin wat rustiger als in de zgn. klapkooien, waarvan de vereniging er 2 bezit.

Alle kooien dienen te zijn voorzien van wit schelpen zand als bodembedekking, met uitzondering van de duiven en kwartels.

Deze worden eerst na de keuring door de TT-commissie van zand voorzien.

Het verlicht de taak van de TT-commissie aanmerkelijk en het komt Uw vogels ten goede indien de vogels bij het inbrengen al zijn of worden voorzien van water en voer.

H.Rens

### **PORTRET VAN EEN PARKIETENKWEKER**

Om onze voorzitter tijdens de prijsuitreiking te citeren: Wie in onze vereniging parkieten zegt, denkt daarbij automatisch aan Frans Stap.

Dat het omgekeerde ook het geval is, bleek uit de inschrijving voor diezelfde TT: zijn grijze roodstaartjes werden in plaats van bij de tropen bij de grote parkieten ingeschreven!

Vandaar dat ik in een van de eerste weken van januari naar Buren ben getogen om eens nader kennis te maken met een echte parkietenkweker.

Het eerste wat mij in het grote (ca 25 m<sup>2</sup>) voliere complex van de familie Stap opviel, waren juist niet zijn parkieten, maar zijn andere vogels.

In een apart vluchtje houdt hij duifjes, kanaries, rijstvogels en wildzang en kweekt hier ook mee.

In het afgelopen jaar wist hij drie groenlingen te kweken en te ringen. Hiervan heeft er maar echter een de jeugdruif overleefd. In de broedruimte van zijn agapornissen is het goed voor elkaar. In 15 Van Keulenkooien (100x50x40 cm) zijn paarsgewijs zijn broedstellen gehuisvest. In de nestblokken, die via rails geruisloos in- en uitschuiven, lagen in het fijn geknaagde wilgehout al vele eieren.

Half januari waren er ook al 17 jongen, waarvan de meeste geringd. Hoewel nog geen van deze jongen volledig in de veren zat, kon Frans met het oog van de kenner, toch al de groene, lutino en zelfs blauwe jongen onderscheiden.

Verder zat er in de broedruimte een juweel van een bourksparkiet met zijn popje, een stel Forpuswim, een stel grasparkieten en, in een van de grote vluchten, een stel roodrugparkieten. De laatste grote vlucht bevatte nog wat jongen van het afgelopen jaar.

Zijn broedruimte (2x3,5m) bevat naast de genoemde kooien een electrisch kacheltje en een stofzuiger. Aan de wand een



jongen zijn.

De ontknoping kan verrassend lang op zich laten wachten want afhankelijk van hun geboortemaand verloren de jongen bij mij soms pas na 7 maanden hun jeugdkleed.

Ze als eerstejaars op de TT-zetten is dus bijna niet mogelijk; zij mogen danook als overjarige vogels worden ingezonden. Op de TT hebben ze het tot nog toe goed gedaan: ze halen al gauw 89 punten. In IJsselstein behaalde mijn dochter (ik had er ook enkele met haar 2,3 ringen van de NBvV geringd) in 1988

het jeugdkampioenschap met een van deze vogels, die met 90 punten werd gewaardeerd. Op deze, bij tropenkwekers hooggenoteerde onderlinge wedstrijd was er geen hoger gewaardeerde tropische vogel te vinden.

Wij hebben nu 6(3 stel durf ik niet meer te zeggen)  
Muskaatvinken van minimaal 2 jaar oud om het komend seizoen te trachten wederom jongen op stok en in de TT kooi te krijgen.

### **Wegwijzer Bastaarden**

- \* Het kweken van kruisingen is een bijzonder onderdeel van de vogelsport.
- \* De meeste kruisingen zijn uitsluitend bestemd voor de tentoonstellingen en vinden plaats tussen een inlandse vinkensoort en een kanarie, maar ook in andere vogel soorten wordt druk gekruist.
- \* Alleen soorten binnen een familie kunnen worden gekruist.
- \* Sommige mannelijke hybriden zijn vruchtbaar, maar de meeste - waarschijnlijk alle - vrouwtjes zijn steriel.

### **Wegwijzer Tropen**

- \* Tropische vogels is een verzamelnaam in onze vereniging voor alle vogels die niet zijn onder te brengen bij kanaries of parkieten.
- \* Tot deze groep behoren vele verschillende soorten met elk hun eigen leefwijze, zoals duiven, kwartels, vruchten- en insekteneters en de zaadetende pracht vinken.
- \* De Australische prachtvinken zijn geen echte vinken. Sinds Australië hun export verboden heeft worden zij in de gehele wereld met veel succes gekweekt.
- \* Ook de Zebrovink behoort tot deze groep en wordt nog vaak gebruikt om ervaring op te doen als vogelkweker. Ze worden in meer dan 50 erkende kleurvariateiten gekweekt.
- \* Japanse meeuwen zijn er eveneens in diverse kleuren. Zij zijn uitstekende pleegouders voor allerlei Vinkachtigen. Doel van onze hobby is echter de omstandigheden zo te maken dat de vogels door de eigen ouders worden uitgebroed en verzorgd.
- \* De kleine Afrikaanse prachtvinken (Astrildes) zijn ideale vogels voor beginners: kleurrijk, goedkoop, gemakkelijk te verzorgen en niet moeilijk te kweken.

\* Al deze soorten vogels doen het goed in ons klimaat. Zomers prefereren ze een goed beplante voliere en in de winter geven ze de voorkeur aan een kooi in een matig verwarmde kamer.

### **Wegwijzer Zang**

- \* De zang van een zangkanarie heet "lied" en in dat lied horen we loopjes.
- \* Er zijn meerdere typen zangkanaries te onderscheiden. De oudste soort is die van de Harzers met een lied dat duidelijk anders is van klank.
- \* Het met gesloten snavel gezongen lied van de Harzer is duidelijk anders dan het luidere, en met open snavel gezongen lied van de waterslager. Kwekers noemen het verschil een nachtegaal-accent.
- \* Zangkanaries vragen veel training, omdat ze als het ware op commando in korte tijd hun lied moeten brengen.
- \* Overigens zingen alle man-kanaries of we ze nu Harzer, kleur of postuur noemen.

### **Wegwijzer Kleurkanaries**

- \* Zang-, kleur- en postuurkanaries hebben allen dezelfde stamvader. Door selectie zijn de verschillende typen ontstaan.
- \* Er worden twee typen kleurvogels onderscheiden, nl.:
  - pigment dat wil zeggen met tekening (strepen)
  - vetstof dat wil zeggen geheel eenkleurig.
- \* De helft van het aantal punten dat een kleurkanarie kan behalen bij een keuring bestaat uit een waardering voor kleur. De andere helft zijn punten voor uiterlijk en conditie.
- \* De kleurpunten staan vermeld bij de uitslag.
- \* De naamgeving aan een kleurkanarie is moeilijk door allerlei erfelijke factoren die de oorspronkelijke

proberen, zou ik die andere ondersoorten maar laten zitten.

Door A. Rutgers wordt voor het broeden een goed begroeide voliere aanbevolen, waarin dan geen andere Lonchurra-soorten aanwezig mogen zijn. De nestjes moeten achter een scherm van klimop en dennetakjes worden verborgen en daarin gaan de vogels nestelen. Als nestmateriaal gebruiken ze in de vrije natuur grashalmen, bamboeblaadjes en fijne plantendeeltjes gebruikt. De vogels zijn volgens hem zeer storingsgevoelig.

Bij mij hebben verschillende stellen Muskaatvinken hun nestgebouwd in:

-een kanariekastje tegen een met vuurdoorn begroeide muur, gebouwd van kokosvezels.

-een rieten korfje in een vlierstruik (kokosvezel)

-een tropenkastje met sluipgang tegen een gazen scheidingwand (hooi).

De vogels zijn in zoverre storingsgevoelig dat het mij nog nooit gelukt is om een Muskaatvink op het nest te betrappen. Ondanks dat ik dagelijks in de voliere kom waarin zij broeden, zijn er toch 16 jonge Muskaatjes op stok gekomen.

De Muskaatvinken eten bij mij wat de pot schaft: een mengeling

van kleine witte maden, buffalo- wormpjes en Universeelvoer is

naast het zaadmenu het opfokvoer.

Omdat ik, in tegenstelling tot het bovenstaande, wel Nonnen en Meeuwen in dezelfde vlucht had en het jeugdkleed van de meeste

soorten ook allemaal hetzelfde chocoladebruin is, blijft het lang een verrassing van wie de eieren en later van wie de

kleurringetje te merken, zodat U in de voliere goed kan zien of een of meerdere vinkjes zingen.

Let wel: dit is het enige betrouwbare middel. Indien een handelaar of kweker U wijzend op uiterlijke verschillen een "stelletje" aanbiedt heeft U (en dat geldt voor bijna alle Lonchura soorten) naar alle waarschijnlijkheid te maken met verschillende ondersoorten.

Bij de muskaatvink kunnen we hier in Nederland te maken krijgen met de 4 volgende ondersoorten: fretensis, nisoria, subundulata en topelea en de nominaatvorm punctulata.

De beide eerste ondersoorten hebben een tweekleurige snavel en grijsgroene bovenstaartdekveren.

Bij L.p.fretensis zien we weinig schubtekening op de rug, bij nisoria een duidelijke schubtekening.

De drie anderen hebben een eenkleurige snavel en de bovenstaartdekveren zijn warm geelbruin.

L.p.punctulata heeft een scherpe schubtekening op de borst en de onderstaartdekveren zijn wit. L.p.subundulata heeft ook de scherpe borsttekening maar de onderstaartdekveren zijn gevlekt op een isabelkleurige ondergrond. Bij L.p.topela is de schubtekening minder duidelijk afgelijnd.

De keuringseis voor de Muskaatvink is duidelijk geent op de nominaatvorm: een eenkleurige snavel en een scherpe schubtekening op rug en borst.

Door hun tweekleurige snavel zullen beide eerste ondersoorten ook al gauw worden aangezien voor bastaarden van de Japanse meeuw.

Overigens wordt ook alleen met de nominaatvorm vrij regelmatig gekweekt. Dus tenzij U het echt met iets speciaals wilt

kleur beïnvloeden.

- \* Een rode kanarie blijft in de huiskamer alleen rood van kleur als er "roodvoer" wordt verstrekt.

### **Wegwijzer Parkieten**

- \* Binnen de groep parkieten maken we verschil tussen de grasparkieten en andere soorten.
- \* De verzamelnaam voor de andere is "grote parkieten". Grote Parkieten zijn lang niet altijd groot. Zie bv. de dwerppapegaaien, Agapornis roseicollis.
- \* Grasparkieten vinden we in het wild alleen in Australië.
- \* Het aantrekkelijke van grasparkieten is vooral de kleur. Toch speelt die bij de keuring nauwelijks een rol.
- \* Engelse parkieten zijn van oorsprong ook gewone grasparkieten. Het zijn grote, zwaargebouwde vogels, met grote, dikke koppen. Zij moeten voldoen aan de kleurstandaard, zoals die door de kwekersverenigingen is vastgelegd.

### **Wegwijzer**

### **Vorm- en Postuurkanaries**

- \* Postuurkanaries zijn er in vele vormen en ze lijken niet op elkaar.
- \* Sommige rassen hebben een voorgeschreven houding. Deze vertonen ze niet voortdurend. Training is erg belangrijk.
- \* Kleur speelt bij deze kanaries geen of een ondergeschikte rol.
- \* Lizards worden nagenoeg alleen op tekening (schubben) gekweekt.
- \* Glosters zijn er met en zonder kuif. De gekuifden noemen we cornona, de gladkoppen heten consort.

### **Het gaat goed met onze TT!**

Op de volgende bladen treft U weer mijn gebruikelijke cijferoverzichten van de tentoonstellingen aan. Dit jaar met een nieuwe kolom: het aantal vogels dat niet voldoet aan het minimum aantal punten dat nodig is om voor een prijs in aanmerking te komen.

Deze kolom zegt iets over het "ondereind" van onze TT, maar vooral iets over het vermogen van de kwekers om goede TT-vogels te selecteren. Over het totaal zien we daarbij een dalende lijn. 5 jaar geleden voldeed 1 op de 3 vogels niet aan deze norm, tegen 1 op de 6 nu. Opvallend is daarbij het verschil tussen de hoofdgroepen.

Bij de zangkanaries haalt meer dan de helft de norm niet, bij de postuur een kwart. Bij de kleur is dat minder dan 10% en bij de overige groepen schommelt dat (door de wat kleinere aantallen) tussen de 0 en 30%.

Wat dit jaar speciaal opvalt is de zeer brede schaal waar binnen de keurmeesters de vogels hebben beoordeeld: 78 voor de laagste en 92 voor de hoogstgewaardeerde vogel.

Uit de cijfers blijkt ook dat we een brede top hebben.

Een op de drie vogels voldoet aan de voor zijn groep gestelde minimumnorm om kampioen te kunnen worden.

Maar ook de kwekers zelf vormen een zeer brede top.

Twee van de drie inzenders slagen er in om een vogel van 90 punten of meer (dus een potentiële kampioen) op de keurtafel te brengen.

Deze kwaliteit brengt wel met zich mee, dat 91-punten vogels nog maar net binnen of zelfs geheel buiten de prijzen vielen.

Ook in aantallen vogels was deze TT een topper. Van de laatste jaren was alleen 1983 groter, maar toen stonden er 3 zangkosten vol met 79 zangvogels. Een groep die dit jaar helaas volledig afwezig was.

Indien we er in zouden slagen in 1988 ook weer deze groep

### **Muskaatvink**

*Lonchura punctulata*

Ondersoorten: *L.p.fretensis*

*L.p.nisoria*

*L.p.subundulata*

Vaderland : Ceylon en Indie

Broeduur : 12 dagen

Ringmaat : 2,5 mm

Uitvlucht na: 21 dagen

Lengte : 12 centimeter

Kleur : chocoladebruin met witte stippen

Zo ongeveer stond de Muskaatvink tot december 1988 in mijn kaartenbakje geregistreerd. Toen las ik in *Onze Vogels* (het maandblad van de NBvV) een artikel van Lucas van Praet over deze aantrekkelijke vogel, waar ik al een aantal jaren achtereen broedresultaten mee weet te behalen.

In dat artikel werden de opvallendste verschillen van de 5 van de 12 ondersoorten die (sporadisch) in de handel te krijgen zijn beschreven.

Zijn bevindingen, die van A. Rutgers en mijn ervaringen met deze veelgehouden maar relatief weinig gekweekte vogels wilde ik U niet onthouden.

De zang van deze vogels is onbeduidend en beter te zien dan te horen. De man staat dan steil omhoog, de veren van de borst zijn opgezet en de kop wordt heen en weer bewogen. Daarbij hoor je dan een zacht gemurmel en enige dunne fluittonen. Dit zingen is ook de enige manier om de sexen te onderscheiden.

Ik

adviseer U dan ook Uw Muskaatvinken door middel van een

### **Doe meer samen!**

Tot voor kort traden de leden van de ECKEV, op een enkele uitzondering na, nauwelijks naar buiten.

Daar lijkt nu een beetje een kentering in te komen. Op de nationale TT in Tiel was op de openingsavond een stevig contingent Culemborgers aanwezig van kleur-, tropen, zang, postuur en parkietenkwekers. Zij konden daar Joop de Rooy en Bram van Velden met hun resultaten feliciteren.

We hebben al jaren zeer goede vogels in onze club. Dat blijkt steeds als er kwekers meedoen aan een nationale of regionale tentoonstelling: regelmatig wordt men daar kampioen, terwijl men in Culemborg nog zijn meerdere in andere vogels moest erkennen.

Dat brengt mij op de vraag of we toch niet meer moeten proberen in verenigingsverband ons te presenteren en (vooral op het gewest en de bondskampioen) niet een gooi moeten doen naar het individuele en clubkampioenschap.

Als we voor de hoofdgroepen kleur, postuur, tropen en parkieten uitgaan van ieder 4 inzenders dan zouden op papier:

Verheyde - De Rooy - Van Dijk - Grazell

Hendriksen- Van Velden- Van Soelen- Kuijer

Bouwman - Van Haaren- Wammes - Rens en

Stap - Van Haaren- Middelcoop- Kuijer

samen toch 10 vogels van gemiddeld 90 punten in kunnen zenden.

Zeker als we na gaan dat er in alle 4 de hoofdgroepen als regel 1 of meer 91 punten vogels bij ons in de show staan.

Meer nog dan van individuele kampioenschappen, waar onze vereniging ook dit jaar buiten onze eigen TT werd bedeed, gaat er van een clubkampioenschap een propaganda uit voor onze eigen show en de daaraan deelnemende kwekers.

binnen onze show te krijgen (ze horen er tenslotte bij!) en er komen wildzangvogels (of hun bastaarden) dan hebben we naar mijn mening een nog completere show.

Een show met 400 vogels van dezelfde kwaliteit van dit jaar is dan ook mijn wens voor de ECKEV in 1988.

Een show, waar de kweker graag inzendt, de keurmeesters graag keuren en de bezoekers graag komen omdat zij er mooie vogels kunnen zien en kopen.

Maar vooralsnog: Een voorspoedig kweekjaar 1988!

H.Rens

### **Culemborgse kwekers succesvol in de regio**

Niet alleen op de eigen tentoonstelling bewijzen de leden van ECKEV dat ze goede vogels hebben ook op andere regionale en nationale tentoonstellingen bewijzen ze hun klasse.

De zangvogels kwamen op de Culemborgse TT helaas niet voor, maar de kwekers kunnen het nog wel!

Op de onderlinge wedstrijd van Kanaria I in Utrecht haalde Chr. Brouwers met zijn harzers een 1e prijs en de derby.

Op de nationale TT in Tiel slaagde M. Wammes er in bij de enkelingen Waterslagers Kampioen te worden. Doordat een vogel zijn bek niet open deed viel zijn stam buiten de prijzen.

Ook F. Stap was in Tiel en behaalde daar met een lutino Rosseicolli van 91 pnt het kampioenschap bij de dwergpapagaaien. Zijn Culemborgse Olijfgroene Kampioen van 92 pnt haalde er volgens het keurbriefje in Tiel maar 86.

K. Grazell speelde bij zowel de kleurkanaries als bij de borders op de onderlinge TT in Bennekom. Hij werd daar met een intensieve oranjerode isabel van 47/91 pnt Algemeen kampioen bij de kleurkanaries en haalde daarnaast een 1e prijs met een intensieve oranje rode.

Hij speelde ook op de kringwedstrijd Rivierenland in Beuningen waaraan 1100 vogels van 6 verenigingen deelnamen.

Hij haalde daar zowel bij de kleur als bij de borders in deze zwaar bezette wedstrijd een 2e prijs.

Ook A. van Velden is met zijn glosters de regio ingetrokken. Hij haalde zowel op de onderlinge wedstrijd in Utrecht als op de nationale Tentoonstelling in Tiel 1e prijzen met zijn gladkoppen.

Op de onderlinge wedstrijd van de NBvV in IJsselstein waren er ook Culemborgse successen.

J.L.Kaper (de beheerder van de voliere op de plantage) behaalde daar zowel bij de Japanse Meeuwen als bij de Zebravinken het kampioenschap en 1e, 2e en 3e prijzen.

Ook het Jeugdkampioenschap bij de Tropische vogels kwam in Culemborgse handen: de Muskaatvink van Marianne Rens behoeft daar in geen enkele andere tropische vogel zijn meerdere te erkennen.

De resultaten van het kampioenschap van het gewest Noordholland Utrecht van de Algemene Bond van Vogelhouders, dat van 16 t.m. 18 december werd gehouden, bevestigdevorenstaande goede resultaten: A. van Velden werd 1e met zijn stam glosters en C. Brouwer werd 5e bij de zangkanaries.

### **Culemborgse kwekers succesvol in de regio**

Niet alleen op de eigen tentoonstelling tonen de leden van ECKEV dat ze goede vogels hebben, ook op andere regionale en nationale tentoonstellingen bewijzen ze hun klasse.

De zangvogels komen op de eigen show van de Eerste Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging helaas niet meer voor, maar de kwekers kunnen het nog wel! Harzerkweker Cor Brouwer sloeg in Utrecht op de onderlinge tentoonstelling een geweldige slag: hij behaalde daar het algemeen kampioenschap, de kampioen stammen (360 punten met 50 predikaatpunten), een eerste prijs bij de stellen en hij verwierf daar de titel meesterzanger! (90 pnt + 15 pr.pnt)

Op de nationale tentoonstelling in Tiel slaagde J.A. de Rooy erin het kampioenschap bij de kleurkanaries te behalen met een oranje rode vogel. Daarnaast behaalde hij met een goudgele kanarie een tweede prijs. Eerder behaalde hij met deze vogels al eerste en tweede prijzen op een nationale wedstrijd in Zeist.

F. Stap slaagde er in Tiel echter niet in om zijn titel uit 1987 te prolongeren. Dat lukte hem wel op de onderlinge wedstrijd in Eck en Wiel, waar hij bovendien met zijn dwergpapagaaien 1e, 2e en 3e prijzen behaalde. Zelfs zijn grasparkieten vielen daar in de prijzen.

A. van Velden bezit dit jaar een prachtige stam glosters corona cinnemon.

Deze 4 identieke kuifkanaries behaalden in Utrecht en Tiel zeer hoge punten en 1e, 2e en 3e prijzen.

Ik sluit niet uit dat ook andere kwekers nog successen hebben behaald, maar zelfs hieruit blijkt duidelijk dat de vogels in onze vereniging zich in bijna alle hoofdgroepen met de beste uit de regio kunnen meten.

Alleen de tropen reden dat nog niet.

In Tiel moest de roodkopgoudlamadine van M. Wammes, die in

Culemborg met 91 pnt kampioen werd, terug naar 87 pnt.

Twee van zijn andere goulds haalden 88 punten. Ook de bastaarden van ondergetekende, in Culemborg meestal goed voor 90 of 91 punten, bleven in Tiel op 86 punten steken.

Deze kwekers hebben nog iets om aan te werken tot ze op het nivo van de kwekers van de Nederlandse Bond zitten.

Ik wens de kwekers die naar het gewest en naar de Kampioen in Zutphen gaan veel succes. H. Rens

Een experimenteel jaar

### **Terugblik op het kweekseizoen 1987.**

1987 was voor mij een heel bijzonder jaar. Half april hadden bijna al mijn kleine tropen, zoals de blauw fazantjes, tijgervinken en goudbuikjes hun nestjes klaar in de toen al welig begroeide voliere en hadden enkele eitjes.

De omslag van het weer, begin mei, en de strenge zomer die daarop volgde maakte dat de vogeltjes hun nestjes in de steek lieten en ook verder nauwelijks meer aan gezinsuitbreiding dachten.

Eerst eind augustus, begin september kwamen er nog een paar broedsels tot stand.

Zo'n jaar leent zich overigens wel voor experimenten, zoals in 1987 b.v. met mijn krachtvoer. Mijn beproefde mengsel van 1 kg eivoer, 1 kg universeelvoer en 2 kg onkruidzaad (4 kg voor ca. 11,85) heb ik na de lezing van de voedingsdeskundige vervangen door een mengeling van 2 kg opfokmeel nr 1 en 2 kg onkruidzaad (4 kg voor 5,10).

En al mijn vogels vraten het en voerden er hun jongen mee. Eerlijkheidshalve vermeld ik hier wel bij dat ik (evenals de vorige seizoenen) van mei tot september mijn vogels per week trakteer op een bakje buffalo-wormpjes gemengd in een pond universeel voer. Maar zonder levend voer krijg je geen astrildes groot.

Een tweede experiment was de bodembedekking in de broedkooien. Tot dat moment gebruikte ik vrij willekeurig wit of bruin schelpenzand. Nu had ik gedurende de zomer een baal zeer fijn gehakseld hennepstro (400 liter voor 17,50). Dit voldeed uitstekend. Het neemt het vocht veel beter op en een aantal vogels zoals de Japanse meeuwen, Spitsstaarten en kanaries gebruikten het zelfs als nestmateriaal.

Een voorwaarde is wel dat de zandladen voldoende hoog zijn omdat anders het materiaal gaat stropen op het moment dat je de laden openschuift.

Omdat die winter mijn oude pop op een morgen dood in de broedkooi - waarin de meeste van mijn vogels laat overwinteren - lag, was ik genoodzaakt al mijn jonge vogels aan te houden om te zien of er uit de 5 resterende vogels zich spontaan een stelletje zou vormen.

Dat bleek, weliswaar aan het eind van de zomer, het geval. Op 1 oktober 1988, werd er wederom een jonge goudbuik geboren. In een gevlochten rieten mandje dat al eerder die zomer door mijn Blauwfazantjes voor drie nesten was gebruikt, had de oude man met een van zijn dochters een nestje gebouwd en 4 eieren bebroed. Het jong heeft het helaas niet gehaald. Naast het levend voer dat ik aan kan bieden schijnen deze vogels ook insectjes uit de vrije natuur nodig te hebben om hun jongen goed groot te kunnen brengen.

En die zijn begin oktober niet meer voorhanden.

De jonge man en een van de andere poppen heb ik ook dit jaar in de open klas ingezonden.

Met 91 en 90 punten behaalden ze de 1e en 2e prijs in de open klasse.

Maar in mijn ogen zijn het eigen kweekvogels, waar ik zeker zo trots op ben als op mijn muskaatvinken die wel een gooi naar het Kampioenschap konden doen.

Ik ben dan ook blij dat ze, 10 huizen verder aan de Otto van Reesweg, een goed tehuis hebben gevonden.

H. Rens.



Nestkontrolle heb ik niet of nauwelijks toe kunnen passen. Door het piepkleine gaatje dat de vogeltjes als toegangsdeur gebruikten kon ik met een vinger wel voelen dat er levende jongen waren, maar niet hoeveel. Toen ik na twee weken al volledig bevederde jongen voelde heb ik de gok genomen het nestje weg te nemen en op mijn gemak op de keukentafel met behulp van de eetlepel van mijn zoon de 4 jongen uit het nestje gepeuterd.

In 1987 had ik echter geen 2,3 of 2,0 mm ringen besteld maar door een stomme fout zowel bij de NBvV als bij Wim van Dijk 2,5 mm ringen. Om toch de jonge vogels onderling en de jonge vogels tov hun ouders te onderscheiden heb ik ze toen met 2,3 mm ringetjes van 1984 geringd.

Dat heeft menig zweetdruppeltje gekost. Vergelijk ik normaal gesproken het ringen van mijn kleine tropen zoals de Blauwfazant al met het proberen elastiekjes door het oog van een naald te krijgen, bij deze nog kleinere vogeltjes ging het nog moeilijker. Doordat de vogels al bijna op uitvliegen stonden had ik gelukkig wat stevige pootjes in handen. Na het ringen heb ik de vogels met nest en al weer terug gezet. Tot mijn grote geruststelling voerden de ouders de jongen weer binnen het kwartier en 4 dagen later was het nest leeg.

Na intensief speuren ontdekte ik de 4 jongen, die nog het meest weg hadden van kleine jonge koolmeesjes, dicht tegen elkaar aan in een tak van de vlier. Ze hadden alle vier nog hun met een stukje ventielslang beklede ringetjes om.

De ouders voerden ze nog een week intensief en daarna, waarschijnlijk omdat ze niet aan een nieuw nest begonnen, nog de hele zomer zo nu en dan.

Aan het eind van de zomer bleek ik in het bezit van 3 jonge goudbuikpoppen en 1 jonge man. Deze man en 1 van zijn zusjes heb ik vorig jaar ingezonden op de TT. Ze kregen resp. 88 en 89 pnt in de open klas.

Mijn derde experiment was met kanaries. Zoals uit onderstaand lijstje blijkt heb ik uit de combinatie kleurkanarie X waterslager 9 jongen uit 2 broedronden op stok gekregen. Omdat het er maar een paar waren hoefde ik ze niet te enten (dacht ik). Of het daardoor nu kwam of door iets anders, in augustus/september stierven de jonge vogels de een na de ander. Ze gingen wat bol zitten, haalden fluitend adem en waren 1 of 2 dagen later dood. In 1988 herhaal ik dit experiment opnieuw; nu zal ik wel enten!

#### Aantal geringde vogels in 1987

1 Europese sijs  
2 Birmatortels  
3 Bastaarden 3 kleurnon x Japanse meeuw  
1 Blauwfazantje  
4 Goudbuikjes  
5 Roodsnavelspitsstaartamadines  
8 Japanse meeuwen (waarvan 4 met kuif)  
9 kanaries  
10 Muskaatvinken  
20 Chinese dwergkwartels  
63 vogels in totaal. Maar niet al mijn stelletjes hebben gebroed. Van mijn zilverbekjes, Goudmussen, Tijgervinken, Schildnonnen en Putters heb ik geen jongen op stok weten te krijgen. Of ze ook geen eitjes hebben gelegd durf ik niet te zeggen. In mijn voliere vind ik zo nu en dan een nest waarvan ik met geen mogelijkheid kan zeggen van wie de eieren zijn. Wie mijn voliere kent zal dat echter niet verbazen.

H. Rens

\*\*\*\*\*

### **Nieuwe serie**

Zoals de redactie al eerder heeft toegezegd zullen we deze jaargang in ons clubblad af en toe een kweker portretteren. Dit is een vervolg op de serie "Portret van een Kampioen" waarvan we vorig jaar 5 afleveringen hebben gehad.

Het ligt in de bedoeling om ook dit jaar alle kweekrichtingen aan de orde te laten komen.

De formules zal niet wezenlijk anders zijn. Ik praat met een aantal kwekers waarvan ik denk dat hun ervaringen en wetenswaardigheden ook voor andere leden interessant zijn en verwerk dat in een stukje.

Om hierover absoluut geen misverstand over te laten bestaan: het is de visie van de schrijver die hier staat afgedrukt en dat betekent niet automatisch dat de geportretteerde het daarmee volledig eens is.

Om dat nog eens extra te benadrukken worden deze stukjes ook in de derde persoon (hij, zij etc) geschreven. De portretten van de vogels waren in de eerste persoon gesteld. Ik hoop dat U ze met plezier zult lezen. Reacties (schriftelijk of mondeling) zijn altijd welkom.

H. Rens

### **Portret van een tropenkweker**

Toen ik op de tentoonstelling de voliere met die vele verschillende tropen gevuld zag worden, dacht ik meteen: daar zit een verhaaltje in. Ik ben dus tijdens de afgelopen winter bij de heer Kuik op bezoek gegaan om eens van nabij te bekijken hoe hij al die verschillende soorten Australische prachtvinken kweekt.

Op de avond van de prijsuitreiking vertelde hij al verschillende soorten jongen te hebben liggen en dat was zeker geen grootspraak. In zijn vogelverblijf (waarvan je je als hij daarover vertelt een veel grotere voorstelling maakt dan het in werkelijkheid is) vlogen al diverse soorten Gouldamadines

ongeveer 6 weken voor de kweektijd wel 3 X per week.

Wanneer iemand hier lering uit wil trekken, durf ik te garanderen, wanneer er verder geen fouten worden gemaakt, zoals poppen die niet broedrijp zijn onoplettendheid bij het toelaten van de man, dat het percentage bevruchte eieren flink zal toenemen.

Voordat ik met kiemzaad begon, had ik de rare gewoonte om tijdens de kweektijd de onbevruchte eieren te bewaren in een schaal. Aan het einde van de kweek was het heel gewoon als hierin 30 tot 35 onbevruchte zaten.

Nu ik mijn vogels kiemzaad verstrek, behoort dit echter tot de verleden tijd.

Hopende dat door dit schrijven meer vogels op stok komen en daardoor de hobby van de liefhebber nog groter wordt en daardoor het aantal vogels op de tentoonstelling met minimaal 10 % zal toenemen. Veel succes, C. Brouwer.

### **Mijn kweek met het kleinste vogeltje op de TT**

Het Goudbuikje

*Amandava subflava*

Toen ik op een mooie zaterdagmorgen in mei 1987 mijn voliere inspekteerde vond ik in de hoek van de voliere op de grond onder de toegangsdeur een prachtig bolvormig nestje dat was gevlochten van kokosvezels en van binnen was bekleed met veertjes. Hierin lag een klein wit eitje.

Om te voorkomen dat de kwartels dat nestje zouden beschadigen heb ik het toen in zijn geheel opgenomen en in een kanarietralienestkastje geplaatst en weer in de hoek teruggezet. Aanvankelijk dacht ik dat het nestje door mijn groene tijgervinken was gemaakt, maar toen na 12 dagen (op 10 juni) bleek dat de eitjes waren uitgekomen zag ik dat het mijn Goudbuikjes waren, die druk met allerlei levend voer, zoals Buffalowormpjes en kleine witte maden, het nestje in en uitvlogen als ik op grote afstand toekeek.

aan de vogels zelf. Het popje is broedrijp als de snavel donker kleurt.

Na twee weken samen in de broedkooi, krijgt het stel er een broedhokje in. Ik vul dat met nestmateriaal (mos) en leg op de bodem van de broedkooi wat uitgelopen sisaltouw. De rest doen de vogels zelf wel, want het wordt een mooi nest, dankzij vooral de man die het meeste werk doet.

### **KIEMZAAD, waarom nog langer onbevuchte eieren ?**

Graag wil ik mijn ervaring over het gebruik van kiemzaad aan het papier toe vertrouwen.

Ik ben nu ongeveer 9 jaar bezig met het kiemen van zaad, met het gevolg dat ik tijdens de broedperiode 90 tot 95% bevruchte eieren van mijn vogels heb.

Het is niet wetenschappelijk, doch pure praktijkervaring. Ik heb van horen zeggen, dat kiemzaad veel vitamine E bevat, hetgeen ik uit mijn ervaring niet tegen kan spreken.

Ik ben begonnen een kiemzaadautomaat aan te schaffen.

Na 3 a 4 dagen waren de kiemen een millimeter lang, maar stond de schimmel een centimeter hoog.

Hierna heb ik een oud bonenblik genomen. In de bodem daarvan boorde ik gaatjes met een boordje van 1 millimeter.

In die bus doe ik een hoeveelheid kiemzaad, zodat de bodem goed bedekt is. Hierna laat ik er warm water over


lopen, (niet te heet) en herhaal dat om de twee uur ongeveer.

Na ongeveer 30 uur ligt er een witte gloed op het zaad en zet ik de bus op de verwarming. Hierdoor kan ik mooi droog zaad voeren.

Ik doe dit het gehele jaar om de twee weken, maar

nog in hun jeugdkleed rond. Andere, al duidelijk broedrijpe paren zaten te wachten tot er in een van de vele broedkooien een plekje voor hen vrij kwam.

Zijn vogelverblijf is een aparte ruimte in zijn tuin:



Hij heeft het verblijf zelf naar eigen inzichten gebouwd. Het is goed geïsoleerd en wordt verwarmd met een gaskachel die er in slaagt om in zomer en winter een temperatuur van 20°C te handhaven. Hier kweekt de heer Kuik in 25 broedkooien met Gouldamadines in vele mutaties, Binzen-astrildes, Bichenow-astrildes en Japanse meeuwen.

In zijn 25 broedkooien gebruikt hij als bodembedekking kranten,

waarop wat vogelgrit wordt gestrooid. Zijn vogels krijgen naast goed tropenzaad (een speciaal mengsel voor Australische prachtvinken) veel gekiemd zaad, krachtvoer en af en toe ook levend voer te eten.

Op de nestkasjes wordt met een sticker aangegeven wanneer de jongen uit moeten komen. Een zeer simpele en overzichtelijke manier om je "kweekadministratie" bij te houden.

Zijn nestkastjes siert hij ook op met gekleurde stickertjes.

De jonge vogels krijgen knijpringetjes in dezelfde kleur om hun poten als de heer Kuik ze uit de broedkooi haalt en in de grote vlucht doet.

Tot zijn spijt kan hij zijn jonge vogels niet met een vaste voeding merken: dat eist een vastere hand als waarover hij kan beschikken.

Daarom zullen we zijn vogels, anders dan ter opluistering in de voliere, ook niet op de TT zien.

## Vogelbeurzen

Een van de manieren om als kweker rechtstreeks van een andere kweker je vogels te betrekken is de verkoopklasse van een tentoonstelling. Een andere manier zijn de vogelbeurzen en -markten die van september tot april overal in het land door vogelverenigingen worden georganiseerd.

Ik heb de mij bekende eens op een rijtje gezet:

Tijdstip    Lokaliteit    Plaats    Bijz.

1e zaterdag    Beurshal Floriada Boskoop  
de Mentere Muntendam

1e zondag    De Vaart, St.Martinusstr. Rucpen

2e zaterdag    Witroka, Westmolendijk Ridderkerk  
Oranjehof, Stationsweg Wezep

2e zondag    P. de Kok, Bredaseweg St.Willibrord Park.

3e zaterdag    Cafe Marktzicht Markt 10 Prinsenbeek  
De leemkuul Eksterstraat Ermelo  
De Vogelvriend, V. Gentst Leerdam

3e zondag    Vervoerscentrum, Brailledr Utrecht  
't Nieuwe Centrum Waspik

4e zondag    De Koppelpaarden Veerseweg Oosterhout NB  
Parochiehuis Gerberastr Aalsmeer

laatste za-    Victoriahuis Sporkenhout Noordwijkerhout  
terdag

De openingstijden van bijna alle beurzen is 10.00-15.00 uur. Op sommige markten is de handel al ver voor die tijd in volle gang, op andere beurzen start de echte handel soms pas tegen sluitingstijd.

Ik acht persoonlijk het verhaal dat je op deze markten alleen maar uitschot tegenkomt overdreven. Met name de kwekers die ook aan de regionale en

aan de hoogste vogel van een groep wordt toegekend is, voor zover ik heb kunnen nagaan, de laatste jaren deze bondsmedaille ook steeds toegevallen aan de kweker met de vijf hoogst gewaardeerde vogels:

in 1988 Verheyde met 451 pnt,

in 1987 Stap met 454 pnt en

in 1986 Rens met 453 pnt

U kunt zelf Uw positie binnen Uw groep en binnen de vereniging bepalen door Uw algemeen gemiddelde te vergelijken met dat van de hoofdgroep, waarvan U de meeste vogels kweekt.

Zolang U boven dat gemiddelde zit, zit U wel goed.

H. Rens

## DOOR HET OOG VAN DE KWEKER.

Tot mijn verbazing las ik me daar in ons verenigingsblad over het wel en wee van mijn vogelverblijf, met al het doen en laten over het houden en kweken van mijn vogels. Leuk gedaan, en ik ben benieuwd naar het volgende portret

Dit brengt mij er toe dan toch ook maar wat ervaringen over te brengen over het kweken van diverse Gouldamadinen. We hebben daar al een stukje over kunnen lezen in het vorige nummer. Toch is het jammer dat deze vogels (en wat zijn ze mooi), in een verkeerd daglicht worden gesteld. Het zouden slechte broedvogels zijn, maar niets is minder waar.

Hier volgen dan mijn ervaringen.

Voor ik met het kweken begin, dat is ongeveer oktober, hebben de kweekvogels ongeveer drie maanden gescheiden van elkaar doorgebracht, in aparte ruimten en niet zichtbaar voor elkaar.

Wanneer de broedvogels in de broedkooi kunnen, zien we

### **Toelichting bij het Tentoonstellingsoverzicht**

"Een show met 400 vogels van dezelfde kwaliteit van 1987 is dan ook mijn wens voor de ECKEV in 1988." zo besloot ik vorig jaar mijn cijfermatig overzicht in dit clubblad.

Die wens is, zoals de cijfers laten zien, niet uit gekomen.

Er kwamen geen 400 maar 296 vogels op de keurtafel te staan.

En hoewel voor mijn gevoel de kwaliteit zeker niet minder was dan in 1987, kwamen er wel lagere punten op de keurbriefjes te staan.

Op de dag van de keuring ontstond na het binnen komen van de eerste uitslagen al de indruk dat er stevig werd gekeurd. De keurmeesters kraakten de vogels niet, maar gaven de punten ook zeker niet cadeau.

Het resultaat blijkt: in alle hoofdgroepen voldeden er meer vogels niet aan de minimumnorm om voor een prijs in aanmerking te kunnen komen en in 3 van de 4 hoofdgroepen voldeden ook minder vogels aan de voor die groep geldende kampioensnorm.

Ook het gemiddelde aantal punten daalde in de rubrieken kleur postuur en tropen. De parkieten vormden zowel in aantal als in beoordeling een gunstige uitzondering Binnen de groep postuur voltrok zich een verandering: de glosters werden in het algemeen hoger en de borders werden in het algemeen lager gewaardeerd dan vorige jaren.

Dat effect blijkt ook uit de lijsten per inzenders: de "grote" borderkwekers moesten in het algemeen een stapje terug met hun algemeen gemiddelde terwijl een glosterkweker pur sang als Bram van Velden het hoogste algemeen gemiddelde van 89,1 (bij meer dan 5 ingezonden vogels) scoorde. Ook met de beste 5 vogels was hij samen met Chris Verheijde de hoogste met 451 pnt.

Hoewel de bondsmedaille volgens een roulatiesysteem jaarlijks

ationale tentoonstellingen meedoen en die gescheiden broed- en TT-vogels hebben, zie je in december en januari met hun uitgespeelde TT-vogels vaak op de markt verschijnen. Als je kijk op vogels hebt is het dan vaak mogelijk om een goede vogel voor een redelijke prijs in handen te krijgen. Je kan dan meteen rechtstreeks van de kweker alle bijzonderheden over voeding, huisvesting en kweek van die vogel vernemen.

Bovendien, het is op die markten met zoveel liefhebbers en handelaren met een gemeenschappelijke hobby vaak ontzettend gezellig.

H . Rens

### **Vlieg-er-eens-uit**

Indien U tijdens de komende vakantieperiode bestemmingen zoekt voor een dagje uit voor U en Uw gezin kan ik U uit eigen ervaring drie doelen aanbevelen.

#### **Avifauna**

De eerste plaats het vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn. Het is niet zo ver, heeft een grote speeltuin, manega en kinderboerderij.

Het park is prachtig aangelegd en men heeft de meer dan 450 vogelsoorten zo natuurgetrouw mogelijk gehuisvest. In de Martinushal, een tropische kas, vliegen de vogels vrij rond de bezoekers.

Het merendeel van de vogels valt in de categorie n Watervogels en fazantachtigen: fazanterie vogels.

Voor onze hobby-vogels is maar een relatief klein deel ingeruimd.

De openingstijden van het park zijn van 09.00 tot 17.00 uur. De toegangsprijs is vijf gulden \*.

## Noorderdierenpark Emmen

Mijn tweede tip is het Noorder Dierenpark in Emmen. Daar heeft men er ook voor gekozen om de dieren zo natuurgetrouw mogelijk te huisvesten en af te stappen van de "Ark van Noach": alle dieren twee aan twee in een hokje.

In de splinternieuwe vlindertuin vliegen naast de vlinders ook de kolibri's vrij rond. Ze drinken gezamenlijk uit de nectarbuisjes die listig in namaakbloemen zijn verstopt.

Voor vogelliefhebbers is de zuidamerikaanse doorvliegkooi het mooiste. Het is een zeer grote kooi van ruim 2000 m<sup>2</sup> bij een hoogte van 10 meter waarin de prachtig gekleurde ara's, glansspreeuwen en neushoornvogels zeer natuurlijk kunnen leven. Ook bezienswaardig is de huisvesting van de weide- en strandvogels. In hun kooi, waar je ook door kunt lopen, is een kunstmatige Eb- en vloed, zodat hun voedselzoekgedrag het best tot zijn recht komt.

Het Noorderdierenpark, een van de modernste dierenparken van de wereld, is geopend van 09.00 tot ca. 18.00 uur (afhankelijk van de zonsondergang). De toegangsprijs bedraagt 14 gulden \*

\* De spoorwegen hebben een gecombineerd trein-toegangs kaartje voor dit park dat voordeliger is.

## Vogelpark Walsrode

Mijn laatste tip is er meer een voor wat meer dagen, een weekend of een Midweek. Het vogelpark vindt U in Westduitsland in het middelpunt van de driehoek die wordt gevormd door de drie grote steden Hamburg, Bremen en Hannover.

ten dele ten goede te zijn gekomen aan de kleurkanaries (in 1985 samen nog goed voor 3/4 van alle ingezonden vogels) en ook aan de wildzang en de grote parkieten.

Bij de NBvV blijken de kleurkanaries en de tropen de verliezers en de (grote) parkieten de winnaars. Bij beide bonden is overigens een gestage groei van het aantal op de TT ingezonden (en gekweekte?) vogels merkbaar.

Als je deze cijfers vergelijkt met onze eigen tentoonstelling vallen we niet echt uit de toon. Ook bij ons een daling van de ingezonden zang- en kleurkanaries en een stijging bij de ingezonden tropen en parkieten. Het al grote aandeel van de vorm- en postuurkanaries is nog verder toegenomen en dat is duidelijk afwijkend van de landelijke tendens.

Overzicht van de in het tentoonstellingsseizoenen 1984/1985 t.m. 1987/1988 ingezonden vogels op de Tentoonstellingen van de Nederlandse Bond van Vogelvrienden en op de Bondskampioen van de Algemene Bond van Vogelshouders (in procenten).

	1987	1986	1985	1984				
Soort	NBvV	AB	NBvV	AB	NBvV	AB	NBvV	AB
Kleurkanaries	41	42	42	38	42	38	44	38
Tropische vogels	12	7	12	6	13	6	12	4
Vorm- en postuur	10	7	9	7	10	7	9	8
Grasparkieten	8	2	8	2	8	2	8	1
Zebravinken	6	2	6	2	6	3	6	3
Grote parkieten	6	3	5	3	5	2	5	1
Agaporniden	6	3	6	3	5	4	5	3
Zangkanaries	3	28	3	33	3	32	3	37
Bastaarden	3	4	3	4	3	3	3	3
Duiven/kwartels	2	1	3	1	2	1	2	1
Japanse meeuwen	1	0	2	0	2	1	2	0
Wildzang	1	1	1	1	1	1	1	1
Totaal vogels	301693	6222	5812	5204	4795			

H. Rens

### **Mode in het houden van vogels**

Net als in vele andere hobby's speelt de mode, of als je het anders wilt noemen de heersende trend, wel degelijk een rol in onze hobby. Nu is het nog wel niet zo dat onze kleurkanarie-kwekers met het opzetten van hun kweekstellen rekening hoeven te houden met de modetinten in het komende winter seizoen, maar een verschil in voorkeur voor een kleurslag is bijna elk jaar wel te merken.

Toen onze hobby van start ging waren het bijna uitsluitend zangkanaries die werden gekweekt. In onze bond vormen ze ook nog een groot percentage van de vogels die jaarlijks naar de bondskampioen worden gezonden. In populariteit zijn ze in de loop der tijd verdrongen door de kleurkanaries in hun vele verschillende kleurslagen. De laatste jaren blijken ook deze weer op de terugtocht, ten gunste van andere kweekrichtingen. Nieuwsgierig geworden door de vrij sterke daling van het aandeel van de zang- en kleurkanaries op onze eigen tentoonstelling heb ik eens bezien of dit een landelijke trend is. Hiervoor ben ik uitgegaan van het aantal vogels dat op alle onder auspiciën van de NBvV georganiseerde TT's werd in gezonden in de jaren 1984 t.m. 1987 en het aantal vogels dat in diezelfde periode werd ingezonden op onze eigen Bonds Kampioen in Zutphen.

Het eerste wat me uit de cijfers opviel was het grote verschil tussen beide bonden. Op elke 10 op de TT's van de NBvV ingezonden vogels zijn er 4 kleurkanaries, 2 tropen, 2 parkieten, 1 postuur kanarie en het restant wordt dan gevormd door zangkanaries, wildzang en bastaarden.

Op de Bondskampioen zijn er op elke 10 vogels ook 4 kleurkanaries, maar verder 3 zangkanaries.

De tropen, parkieten, vorm- en postuurkanaries, wildzang en bastaarden scoren daar allemaal (ver) onder de 10%.

Bij de Algemene Bond blijkt het verlies van de Zangkanaries

Het is al weer een aantal jaren geleden dat ik dit park bezocht maar het staat met nog steeds voor de geest als voorbeeld van hoe vogels in gevangenschap gehuisvest moeten worden. De volieres zijn schoon, ruim en zo natuurgetrouw mogelijk. Ze worden zoveel mogelijk omzoomd en beplant met bomen en struiken. Nadat dit park in 1958 als fazanterie van een liefhebber is gestart is het in deze 30 jaar uitgegroeid tot een park met meer dan 1,5 miljoen bezoekers per jaar. In het hoogseizoen houden meer dan 150 personeelsleden de zaak goed op orde. Dat dit park is gegroeid uit een fazanterie met watervogels is wel nog te merken, maar in dit park worden ook onze hobby vogels in een groot aantal variëteiten en soorten gehouden en, wat nog belangrijker is, gekweekt. In dit park tref je veel grote vluchten aan, waar je als bezoeker te midden van de vogels kunt lopen. De grootste hal omvat meer dan 3000 m<sup>2</sup> vloeroppervlakte en is meer dan 12 meter hoog. Hierin is ook een kunstmatig strand met golven aangebracht. De sterntjes kan je net als in de vrije natuur tijdens het voedsel zoeken zien dansen op de vloedlijn.

De papagaaien en Neophema-soorten zijn in speciale tehuizen ondergebracht, evenals gieren, roofvogels, uilen en andere.

Ook hier zijn de kolibri's vrij in een tropische kas ondergebracht, zodat je hun helicopterachtige wijze van voedselzoeken van zeer nabij kunt aanschouwen. Elke vogelliefhebber, die de kans krijgt een of meerdere dagen in dit park door te brengen, moet die kans naar mijn mening met beide handen aangrijpen. Het park is dagelijks van 09.00 tot zonsondergang geopend. De huidige toegangsprijs is mij niet bekend, maar aangezien de entreegelden volledig worden benut om het park te onderhouden en uit te breiden, zeker niet te duur.

H . Rens

### **Portret van een dubbele boekhouder**

Wat mij onmiddellijk opviel toen ik deze winter en dit voorjaar Karel Grazell bezocht, was zijn punctualiteit. Precies heeft hij in zijn hoofd en op schrift welke vogel waar zit, welke punten die vogels (en hun broers en zusters) op de TT's hebben behaald, wat die vogel gekost heeft e.d.

Zijn kweekboek kan menige boekhouder tot voorbeeld dienen, maar ook op de kooien zelf heeft hij met behulp van stickers nauwkeurig het verloop van het broedproces aangegeven. Ook de kooien en de kweekruimte zijn door hemzelf gemaakt en ingericht en een toonbeeld van orde en netheid. Maar genoeg nu over de buitenkant, de inhoud van de kooien is het belangrijkste.

Grazell is geen specialist, hij kweekt met verschillende soorten en kleurslagen vogels. Dit zijn oranjeroodisabelle en oranjerode kleurkanaries, borders en - als het wil lukken - grasparkieten.

Deze diversificatie heeft op het oog geen weerslag op de kwaliteit: hij heeft al verscheidene jaren zeer goede vogels.

In 1984 "debuteerde" hij met een 1e en een 3e prijs bij de stammen kleur, de derby kleur, de Bonnouvrie-prijs en ook nog een 3e prijs bij de borders. Succes op alle fronten dus.

Ook in de jaren daarna haalde Grazell zowel met zijn Kleurkanaries als met de andere soorten 1e of ere-prijzen binnen. Kampioen is hij echter binnen onze vereniging nog niet geweest. Wel heeft hij het afgelopen jaar op de regionale TT in Bennekom het algemeen Kampioenschap behaald.

Als je Karel Grazell zou vragen hoe hij zijn langdurige succes verklaart, krijg je waarschijnlijk een zeer uitgebreid antwoord, waarin hij meerdere oorzaken noemt. Naast de zeer nauwgezette reiniging en verzorging van zijn kooien en de goede voeding is naar mijn mening ook zijn aan- en verkoopbeleid een belangrijke oorzaak.

Hij is niet te beroerd om (heel) veel geld voor (zeer) goede vogels neer te tellen. Daar tegenover staat dat hij, ook op vogelmarkten, geen consessies doet aan zijn verkoopprijs. Vogels, die hij wil kopen onderwerpt hij ook aan een zeer uitgebreid onderzoek en de betrokken kweker aan een stevige ondervraging. Ook als je bij Grazell vogels komt kopen moet je daar wel enige tijd voor uittrekken. Je krijgt dan, voor je de vogel meekrijgt, zeer uitgebreide voedings- en verzorgingsadviezen mee. Toch omvat zijn wijze van voeding, huisvesting en verzorging op het oog weinig bijzonders. Alle vogels zitten binnen gehuisvest. Ze krijgen kanariezaad en grit en zonodig eivoer. Hij heeft gewone nestkastjes en zijn kanaries huisvest hij paarsgewijs (de man blijft als het goed gaat het hele kweekseizoen bij de pop). Hij begint vrij laat (nou ja, in april) met broeden en tot de langste dag mogen zijn vogels met een nieuwe ronde beginnen. Het enige bijzondere wat ik heb kunnen ontdekken is Grazell zijn gehechtheid aan Gezasept. Hij gebruikt dit middel zowel preventief in het bad en drinkwater als curatief als medicijn. Mede hierdoor is wellicht zijn lage sterftepercentage (ca 4%) te verklaren.

Voor het komend TT-seizoen durft hij nog geen voorspellingen te doen. Het gaat heel niet, was zijn reactie toen ik hem in juni opzocht. Dat je dit meteen korreltje zout moet nemen bleek wel toen hij nog 25 geringde jongen kon tonen. Maar toch bleken vooral de borders en de oranjerode het een beetje af te laten weten. Maar hij was nog niet uitgebroeid en veel vogels zaten nog op eieren. Eerst op de ochtend van de keuring zijn de kaarten definitief geschud.

Ik denk zelf dat ook dit jaar Karel Grazell zowel bij de kleur als bij de postuur en de parkieten weer een kweker zal zijn om terdege rekening mee te houden.