

**Uitnodiging voor de Kaartavond die wordt gehouden op vrijdag 24 mei 2002 in Party-centrum De Lantaarn aan de Grote Kerkstraat 13**

**De eerstvolgende ledenbijeenkomst op 2 mei komt te vervallen. Op 24 mei is er een extra kaartavond voor leden, huisgenoten en introducees**



We beginnen om 20.00 uur, maar de zaal is al eerder open.

Naast het kaarten zullen we natuurlijk ook aan enkele andere zaken aandacht besteden:

- De mogelijkheid om uw contributie te betalen en ringen te bestellen en natuurlijk

- Uitgebreid met elkaar bij te praten over onze hobby.

**We zijn verhuisd**

**ECKEV**

De website van de Eerste Culemborgse Kanarie en Exotenvereniging werd te groot en is verplaatst naar een server van het Culemborgse kabelnet en wel op

<http://home.cable4u.nl/~rens-r9>

Daar is nog meer informatie over onze vereniging en de verschillende vogels te vinden.

Ook staat daar vaak als eerste het nieuws voor U als leden en zijn daar de oude artikelen uit ons clubblad terug te vinden.

De afdeling vraag en aanbod is weer beperkt tot 1 pagina. Er zijn op dit moment zeer veel drukbezochte en gratis marktplaatsen voor onze hobby op het internet te vinden.

De oude plek wordt vanaf eind april 2002 in genomen door de site van de Speciaal Club Exoten en Parkieten van de ANBvV. Daar wordt op dit moment hard aan gewerkt.

  
**ECKEV**

Surf eens langs

## Kanariepokken kunt U gelukkig voorkomen

Kanariepokken is een dodelijke ziekte.  
Geneesmiddelen tegen deze ziekte bestaan niet.  
Maar gelukkig kunnen we onze vogels wel beschermen  
door ze te enten.



Via een van onze  
zustersverenigingen is  
het ook dit jaar weer  
mogelijk om entstof  
tegen de kanariepokken  
te bestellen.

Dit jaar is de prijs €  
21,- per flacon.  
Dat is genoeg voor 50-  
60 kanaries.

Tot en met de leden-  
bijeenkomst op 2 mei  
kan er nog besteld  
worden.

De entstof wordt dan in de eerste zaterdag in juni  
opgehaald en direct daarna voor u beschikbaar.

De entstof is alleen tegen contante betaling vooraf te  
bestellen bij H. Rens, Otto van Reesweg 45 in Culemborg.

- Telefonisch bestellen is helaas niet mogelijk.

## Van de T.C. Cultuurvogels/hybriden

### Aanpassing standardeis GOUDVINK

De laatste jaren is er enige discussie ontstaan over de kleur van de grote vleugelpennen. De standardeis geeft aan: volledig zwarte pennen. Dit is echter niet juist: alle goudvinken blijken namelijk een kleine witte omzoming aan de 4 of 5 grote pennen te hebben. De Technische Commissie heeft dit bij een flink aantal vogels en op dia's vastgesteld.

Bij het schrijven van de standardeisen is hier waarschijnlijk niet genoeg op gelet zodat een aanpassing dan ook zeker op zijn plaats is. In de praktijk blijkt echter dat de witte omzoming in verschillende gradaties voorkomt. Bij enkele vogels is deze omzoming zo groot dat het echt storend werkt. Op de laatst gehouden Technische dag waren vogels aanwezig waarbij de aanwezige keurmeesters duidelijk de verschillende gradaties konden zien. De afspraak die op deze dag ten aanzien van de keuringen is gemaakt is:

Wanneer een goudvink een goede houding aanneemt en de vleugels goed gesloten zijn, moet de witte omzoming bijna niet te zien zijn. Is er wel een duidelijk zichtbare witte zoom te zien dan zal dit als fout worden aangemerkt en gestraft worden in de rubriek grondkleur en tekening. Dit geldt uiteraard voor zowel de man als de pop.

Met deze aanpassing hoopt de Technische Commissie Europese vogels/hybriden dat dit voor de kwekers en keurmeesters duidelijk is.

Namens de T.C.Cultuurvogels/hybriden, Bennie Horsting

## Laatste kans om ringen te bestellen voor 2002

We moeten allemaal nog even wennen aan de gewijzigde procedures voor het bestellen van ringen, maar op 1 mei sluit de mogelijkheid om nog voor het kweekjaar 2002 ringen te bestellen.

Dat houdt in dat Uw bestelling uiterlijk op zaterdag 27 april in het bezit van onze ringencommissaris Jan Middelkoop moet zijn om nog voor levering van de ringen in aanmerking te komen.

Het bestel formulier hebben we op de achterzijde van ons clubblad afgedrukt.

Mocht U toch zonder ringen (zijn) komen te zitten en deze van een ander lid van onze vereniging hebben overgenomen dan wijzen we U op de mogelijkheid om tot 1 juli van dit jaar deze ringen alleen **voor onze eigen onderlinge tentoonstelling** als eigen kweek te laten registreren.

U moet dan tijdig een opgave van welke ringen (ringmaat en volgnummers) dit betreft vergezeld van een handtekening van beide kwekers bij het bestuur (maar liefst bij de ringencommissaris) indienen.

Ook hiervoor is een formulier in dit clubblad opgenomen.

Op dit formulier kunt U ook aangeven als U ringen van uw **eigen** kweeknummer bij een andere erkende vogelbond bij de ANBvV als eigen kweeknummer wilt laten registreren.

Aan deze registratie bij de Bond zijn € 3,40 kostenverbonden.

Leden, die zich al eerder voor deze registratie hebben aangemeld, hoeven zich niet opnieuw aan te melden. Wel moeten ook zij die € 3,40 jaarlijkse registratiekosten betalen.

In het april nummer van Vogelvreugd zijn de nieuwe bepalingen en prijzen van de ringen ingaande het kweekseizoen 2003 opgenomen.

We raden met name de kwekers van Europese cultuurvogels aan deze nieuwe regelgeving goed te bestuderen. Bij vragen en onduidelijkheden kunt U altijd bij het bestuur terecht.

## De Splendidparkiet

De soorten van de familie Neophema behoren

zonder twijfel tot de fraaiste en meest elegante Australische parkieten, die zonder al te veel problemen ook in een goed beplante gezelschapsvolière kan worden gehouden.

Van alle Neophema-soorten is de Splendidparkiet *Neophema splendida* niet alleen de kleurrijkste maar ook de rustigste vertegenwoordiger. Zij leven in licht heuvelland in West Australië. Zij voeden zich daar met de zaden van de verschillende grassoorten en eucalyptusstruiken. Drinken doet deze soort maar heel weinig: hij heeft zelfs een uitgesproken hekel aan water. Ook vorst verdragen deze schitterende vogels slecht.



Splendidparkieten broeden in de natuur in gaten van takken en bomen op geringe hoogten en hebben veel kleinere nesten dan de overige neophema-soorten. Meestal is het legsel drie eieren, zelden 4 of meer. De broedtijd valt in hun geboorte land in september en oktober, in Nederland beginnen ze vaak ook al hartje winter met hun nest.

Het verdient dan ook dringende aanbeveling om deze vogels alleen in een vorstvrije ruimte te laten overwinteren om te voorkomen dat ze aan legnod of longontsteking ten onder gaan.

Hoeveel de splendidparkieten niet meer zo extreem duur zijn als enkele tientallen jaren geleden, ze zijn nog altijd zeldzamer en dus

kostbaarder dan bv hun nauwverwante soortgenoot de turquise parkiet.

Er zijn met de splendid de laatste jaren veel mutaties gekweekt, waardoor er nog maar heel weinig echt zuivere wildkleur mannen en poppen te koop zijn. Toch vind ik persoonlijk de wildkleur de mooiste kleurslag. Het is echte moeilijk zuivere wildkleur poppen te kloppen. Bovendien lijken de poppen van de Turquise parkiet en de splendidparkiet sterk op elkaar, maar het turquise blauw aan kop- en vleugels is veel lichter van kleur.

De wildkleur splendidman heeft een blauwe kop, een blauwe nek, dat in donkerblauw overloopt bij de zwarte snavel, groene nek, borst en rug, gele buik en staart onderdek. Het meestkenmerkende bij de man is de rode plek op de borst, waarvan de grootte individueel sterk afwijkt.

Jonge mannen laten zich na drie maanden al kennen omdat dan de eerste rode veertjes op de borst zichtbaar worden.

Andere neophema-soorten, die veel in de Nederlandse volières worden gehouden zijn:

De turquise parkiet    Neophema pulchella  
De elegant parkiet    Neophema elegans  
De blauwvleugelparkiet Neophema chrysostoma  
De oranjebuikparkiet    Neophema chrysogaster.

De rotsarkiet            Neophema petrophila is veel zeldzamer in de West Europese volières.

De bourkes parkiet, Neophema bourkii, is niet zo zeldzaam, maar wordt door diverse auteurs ingedeeld als Neopsephotus bourkii, omdat er nog geen bastaarden met de andere soorten bekend zijn.

Voor U beschreven door: Henk Rens

Terug naar de beschrijving van de ideale Gloster. Waar de Corona getooid moet zijn met een mooie kuif, wordt voor de Gloster Consort een vogel verwacht met een goede brede kop. Omdat bij de Corona een hoge gewelfde kuif op prijs gesteld wordt, moet de kweekpartner natuurlijk ook een kop hebben die de basis kan zijn voor een dergelijke kuif. een brede, goed afgeronde kop met een hoog voorhoofd is ideaal. Het lichaam van de Gloster is vrij kort en breed. Dat begint reeds bij de hals, die kort en dik is; die korte overgang van kop naar lichaam is belangrijk om de gedrongen lichaamsvorm te verkrijgen. De rug van de Gloster is breed en licht gewelfd. De borst is breed en goed afgerond, de zachte rondingen moeten zich uitstrekken over de flanken tot de onderbuik. De borst moet wel afgerond zijn, maar mag niet te zwaar of hoekig zijn. het komt nogal eens voor dat een Gloster te vet is, waardoor de vogel wel breed lijkt maar ook te hoekig.

Niet alleen het lichaam van de Gloster moet kort zijn, maar de rest van zijn lichaam ook. Zo zal hij korte snavel, poten en staart moeten hebben. Het dijbeen mag bijna niet zichtbaar zijn. Het is erg belangrijk hier op te letten bij het samenstellen van de kweekparen. De lengte die voor de Gloster voorgeschreven staat is 11,5 cm. Maar slecht zelden vinden we een vogel met die afmetingen. Vaker zal men een kampioen zien van 13 cm. Maar toch zal altijd de kleinste vogel een grotere kans hebben te winnen, mits hij ook inderdaad de rest van punten voor de ideale Gloster laat zien.


Het is bij de Gloster ook belangrijk de jongen niet te beschadigen. Vooral het uittrekken van staartpennen is erg nadelig voor het mooie uiterlijk van de jongen Gloster. een nieuwe staartpen bij een jongen vogel is altijd is langer, soms wel een halve centimeter. Dit is natuurlijk funest voor de korte vorm van de Gloster. het is dan ook raadzaam de meest belovende jonge Glosters tijdig af te zonderen, opdat ze onbeschadigd op de wedstrijden kunnen komen.

met elkaar gekruist, waarschijnlijk zonder nu zelf precies te weten welke soorten. Bij de eerste kruisingen zijn een kleine harzer en een kleine Border betrokken geweest. De jongen hieruit werden gepaard aan een kleine gekuifde Norwich, en het resultaat kennen we dan als de Gloster. De vrouw die deze miniatuur cresten kweekte toonde haar vogels voor het eerst op de nationale show van Engeland in Crystal Palace in 1925.

De keurmeester die de kuifkanaries moest keuren was zo onder de indruk van deze miniatuur Cresten dat hij onmiddellijk zijn medejuryleden wist te winnen voor voor deze vogels. Ze werden dan ook beoordeeld met een eerste en een tweede plaats. En met deze gebeurtenis was de geboorte van de Gloster een feit.

De Gloster is een kleine gedrongen vogel, die in twee vormen voorkomt, de kuif- en de gladkopvorm. De kuifvorm noemen we de Gloster Corona, dit corona duidt op de vorm van de kuif, die er inderdaad uit moet zien als een kroon. De kweekpartner voor de corona is de consort, de gladkop. De kop van de corona is een verzameling van veertjes, die samen een bloem vormen. Deze veertjes groeien van een klein middelpunt die goed centraal op het hoofd moet liggen. De kuifveren moeten zo lang mogelijk zijn. Dit klinkt misschien wat vreemd, omdat de kuif bij een Gloster niet over de ogen of snavel mag hangen. Maar als de kuifveren lang zijn betekent dit dat de kuif mooi en gewelfd is. Juist door die hoge gewelfde kuif ontstaat de gewenste kroonvorm. Helaas ziet men ook nog vaak de kleine platte kuiven, dikwijls is een te harde bevedering de mede oorzaak van een slecht kuifvorm. Vooral aan de achterzijde kan een kuif slecht aansluiten met de lichaamsbevedering als de kuif te plat is. Daarom zien we de laatste jaren ook steeds meer bruinfactorige Glosters verschijnen. Die bruine kleur geeft de bevedering een zachte zijdeachtige structuur. Helaas wordt meestal het hele uiterlijk van een bruine Gloster wat makkelijk wat te smal,

zodat men altijd zorgvuldig de voor- en nadelen van het inkweken van de bruifactor moet afwegen.



### **Roodoorbulbuul *Pycnonotus jocosus* (Linnaeus)**

De eerste Roodoorbulbuuls kwamen reeds lang geleden naar Europa. In 1857 waren ze al in Artis in Amsterdam, in 1865 ook in Londen; sedertdien komen ze regelmatig en in grote aantallen in de handel. Ze worden graag gehouden om hun zang, hun levendig gedrag en omdat ze niet schuw zijn. In hun geboorteland, vooral in India, is het een van de meest gehouden kooivogels. Tegenover andere vogels zijn ze verdraagzaam, maar tegenover soortgenoten agressief. Na gewenning zijn ze gemakkelijk te houden en sterk. De vogels baden graag.

Bij de man zijn de bovenkop en de spitse naar bovengerichte kuif zwart, verdere bovenzijde bruin. Slagpennen donkerbruin, evenals de staart, punten van de veren zwartachtig, de 4 middelste veren hebben een witte vlek aan de punt van de binnenvlag, bij de buitenste veren zijn de punten van de buitenvlag wit. Oorstreek met mat glanzende karmijnrode vlek, daaronder witte langwerpige vlek, die van onderen door een zwarte band omzoomd is. Onderzijde wit, naar de flanken toe meer bruinig, aan de zijkanten van de borst hebben ze een donkerbruine dwarslopende band. Onderstaartdekveren rood. Oog : bruin, snavel zwart, poten donker hoornkleurig.

De pop is kleiner dan de man, rug en onderstaartdekveren lichter gekleurd, oorvlek kleiner. De jongen hebben een bruine bovenkop zonder rode oorstreek.

De vogels leven aan de randen van oerwouden, parken, plantages, tuinen en zelfs in dorpen. Ze leven in groepen en houden zich meestal in dichte struiken en gebladerte op, komen zelden op de grond. Wildvang komt meestal zwak in Europa aan, ze zijn schuw en hebben behoefte aan warmte. In de begintijd fruit, verse miereneieren, meelwormen en een goed universeelvoer geven, echter niet te veel fruit, want dan eten ze geen universeelvoer. De vogels onderbrengen in een kleine volièrre of grote kooi. Ze zijn goed geschikt voor een kooi (minimaal 80 cm lang), takken als zitstokken aanbrenge. Minstens 2 keer per dag vrij in de kamer laten rondvliegen, met wat meelwormen in de kooi teruglokken. Het zijn ideale vogels voor een gezelschapsvolièrre, waar ze het beste paarsgewijze kunnen worden gehouden, niet meerdere exemplaren van dezelfde soort tezamen houden (zie Algemeen). Gezonde vogels, die goed in conditie zijn, kunnen in de buitenvolièrre worden ondergebracht, waarin ze ook kunnen blijven, als er maar een nachthok aanwezig is.

LENGTE 20 cm.

GELUID: Roep `pettigroe', de zang is wiewaalachtig, maar niet zo afwisselend, ongeveer als volgt: `die - dio - dio - di - dio juu - juu - juu - juu' of `de - diejuu, dejuu',het is aangenaam en goed klinkend.

VOEDING: Universeelvoer vermengd met wat fijn gesneden runderhart, bessen, stukjes fruit en gedroogde miereneitjes, verder verse miereneieren, kleine rupsen, wormen en meelwormen.

KWEEK Reeds meermalen gelukt, zowel in een grote kooi als in een volièrre, het beste is een paartje alleen te houden. Het nest maken ze in struiken, op begroeide veranda's en tegen de wanden van hutten. Vaak maken ze tussen stevige takken van struiken een vrijstaand

nest van berkenbast, droge grashalmen, bladeren, wortels en kokosvezels, overwegend door de pop. Vaak ook maken ze het nest in een kanariënestkastje of een broedkorfje. Het nest is een brede nap, gemaakt van grassen, kleine wortels en bladeren. Broedtijd: december- juli, 1 broedsel per jaar. Balts: met hangende vleugels, gespreide staart en opgeheven kuif danst de man om de pop. Voor de nestbouw jaagt de man fel achter het popje aan. Legsel: 2-4 roodachtig grijze eieren met zwarte, rode en purperkleurige vlekken. Met broeden wordt bij het leggen van het voorlaatste ei begonnen. Bij het broeden wordt de pop slechts af en toe door de man afgelost. Broedtijd: 11 dagen.

Opfokvoer: verse miereneitjes, pissebedden, sprinkhanen, muggenlarven en meelwormen. Beslissend voor een goed kweekresultaat is de mogelijkheid om de vogels een grote hoeveelheid afwisselend levend voedsel te geven. man en pop voeren. De jongen verlaten na 11-12 dagen het nest en kunnen dan nauwelijks vliegen; ze worden dan nog lange tijd gevoerd, pas vanaf de 20e dag eten ze zelfstandig. Niet v66r ze 35 dagen oud zijn van de ouders scheiden.

MEDISCHE AANWIJZINGEN Als een nest lange tijd aan de zon is blootgesteld, dan op het dak van de volièrre wat takken met bladeren ter bescherming zetten, anders krijgen de jongen een zonnesteek

*Ook deze vogel is onze website beschreven door H. Rens*

## De Gloster



De Gloster is de meest gehouden postuurkanarie in Nederland. In zijn geboorteland Engeland moet de Gloster nog genoegen nemen met een tweede plaats in aantallen op de tentoonstellingen, daar is de Border altijd nog de meest gehouden vogel.

Dat dit ras bij ons zo populair is dankt hij aan het feit dat het geen moeilijke

vogel is om mee te kweken, maar dat is een kant van de medaille. De andere geldt dan voor de wedstrijden; in dat opzicht is de Gloster heus nog niet zo makkelijk. In de eerste plaats is het beslist niet zo eenvoudig Glosters te kweken die volledig beantwoorden aan de standaardbeschrijving en ten tweede is de concurrentie op de wedstrijden ook erg groot. Juist door die grote inzendingen van Glosters op tentoonstellingen is de kans om met deze vogels prijzen te behalen maar klein. Toch is het zo dat deze kleine beate (zoals hij ook wel genoemd werd) door bijna elke postuurlijefhebber wel gekweekt word of werd. Op de onderlinge tentoonstellingen ziet men in de klasse van de postuurkanaries vaak dat meer dan de helft Glosters zijn. Toch is de Gloster nog maar een jong ras onder de postuurkanaries.

De Gloster vond zijn oorsprong in Cheltenham in het Engelse graafschap Gloucester. daar had een Engelse dame een aantal vogels