



De Heus

DIERVOEDERS

Agri-shop

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

- PAVO & Havens Paardenvoeders
- Cavalor paardenvoeders
- Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
- Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

augustus 2006



*Eerste Culomborgse
Kanarie- en Exoten
Vereniging*

opgericht 20 januari 1947

Kamer van Koophandel

Tel: V157549

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Voorzitter: H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326
- Secretaris: J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664
- Penningmeester/
ledenadministratie J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697060
- 2° Voorzitter: F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896
- 2° Penningmeester: M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450
- Materiaalbeheer: H.M.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371
- Ringencommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail h.rens@hccnet.nl) en J. Pieters

Website: www.cable4u.nl/~rens-r9/index.html

Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari/1 juli van het betreffende jaar. Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00
Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester
E.C.K.E.V. Girorekening 3980719



JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om
vakkundig gerepareerd te worden.

NICO BRON

Herenstraat 19
Culemborg
Tel. 0345 - 513530

een gecertificeerd Meester Schoenmaker



Uitnodiging

Op dinsdag 19 september is de start van ons nieuwe winterseizoen.

Deze avond komt Kor Zegelaar, een internationaal parkietenkeurmeester uit Papendrecht, een lezing houden over de vele verschillende soorten kromsnnavels die in hobbyverband worden gehouden.

Een avond, in gewoon Nederlands, met veel praktische informatie en met heel veel mooie dia's.

Ook voor houders en kwekers van andere vogelsoorten een leerzame avond. We beginnen klokslag 8 uur met de lezing, maar vanaf half 8 is de zaal open voor een kop koffie en alvast even bijpraten over het afgelopen kweekseizoen.

Verder zullen we deze avond een datum prikken voor een bijeenkomst met de TT-commissie en zullen er wat organisatorische zaken, zoals de gewestelijke vergadering aan de orde komen .

Noteert U vast in uw agenda:

- 17 oktober 20.00 uur Europese Cultuur en inleveren inschrijfformulieren
- 24 oktober 20.00 uur Vaststellen groepsindeling en uitreiken kooinummers
- 09 november 14.00 uur Opbouw TT
- 09 november 21.00 uur Inbrengen vogels
- 10 november 08.00 uur Keuring
- 10 november 20.00 uur Opening TT
- 11 november 10.00-18.00 uur TT Open
- 12 november 15.30 Trekking loterij

Vogeltjes kijken

De eerste vogelshows worden al in september gehouden.

De Euro show van de BVA in Aalst (Belgie) wordt in het weekend van 9 en 10 september gehouden en zal door enkele (bestuurs)leden worden bezocht.

Wat dichterbij huis zijn de overige (parkieten)shows in september:

Organisatie	Datum	Wedstrijdzaal
PSC	15 t/m 16 sep	V.V. Witroka, Westmolendijk 99, Ridderkerk
PSC	22 t/m 23 sep	Veenendaal Hal, Nijverheidslaan 8 Veenendaal
Jap Meeuwen	30 sept	Leerdam, P.M. van Gendstr 23
Gouldam	22-23 sept.	De Brug, Ginderover 2 Heeze



Memo

Het tentoonstellingsseizoen staat al weer voor de deur. Eind september en begin oktober zijn de eerste wedstrijden al. Voor de tropen en parkietenkwekers is er de mogelijkheid om deel te nemen aan de open wedstrijd van de speciaalclub exoten en parkieten die op 8 en 9 oktober in Heeswijk Dinther wordt gehouden. Zowel het inschrijven als het inbrengen van de vogels kan in Culemborg geschieden. Inschrijfformulieren zijn bij H. Rens (518326) aan te vragen en kunnen tot uiterlijk 25 september weer bij hem worden ingeleverd. Een goede kans om al vroeg in het seizoen de vogels te laten beoordelen en ze te laten wennen aan de omstandigheden tijdens een show.

De vergunning voor onze loterij is door de gemeente Culemborg weer toegekend. We hopen dat alle leden willen helpen de loten te verkopen. Er zijn aan de loterij weer mooie prijzen verbonden.

Op 19 september houdt Kor Zegelaar, internationaal parkietenkeurmeester, in het Rode Kruisgebouw voor ons een lezing over allerlei soorten parkieten. Zie de uitnodiging elders in het blad.

Als u kwartels, kippen, fazanten of andere hoenderachtigen heeft houdt u er dan rekening mee dat ze vanaf 1 september weer in overdekte rennen moeten zijn gehuisvest. De ophokplicht is dan weer van kracht.



BUSH BUDGIES

Budgerigars in the bush, bush budgies, grasparkieten in de bush, of doodgewoon wildvorm grasparkieten, het zijn allemaal benamingen voor de oorspronkelijke grasparkiet, zoals ze bij miljoenen in het binnenland van Australië voorkomen.

Helaas is deze ongetwijfeld meest voorkomende parkiet van Australië met zijn lichtgroene kleur, gele masker en karakteristieke zwarte golftekening vandaag de dag bij de grasparkietliefhebber nauwelijks nog in tel. Immers, ruim 160 jaar domesticatie hebben de grasparkiet extreem veranderd. In 1864 ontstaat de eerste kleurmutatie: de overgoten grasparkiet. In hetzelfde jaar verschijnt ook de bonte grasparkiet, in 1879 worden in België de eerste lutino's geboren en in 1910 worden vanuit Frankrijk de eerste blauwen gemeld. In 1915 volgen de donkergroenen en in 1919 ziet de eerste olijfgroene het levenslicht. In 1920 zijn er kobaltblauwe vogels en een jaar later ook de mauves. Ik zou met de opsomming van de kleurmutaties zo nog wel een tijdje door kunnen gaan, maar in 1921 zitten we al middenin de kleur fok of anders gezegd: het fokken van grasparkieten op kleur. De nieuwe kleurslagen ontketenden een ware rage onder de mensen waardoor de fok een nieuwe stimulans kreeg. De massafokkerijen beleefden gouden tijden mede doordat er steeds nieuwe kleurslagen bijkwamen, die voor fabelachtige prijzen werden verhandeld. Toen al speelde de commercie in het parkietenwereldje de voornaamste rol en dat is helaas altijd zo gebleven. Er was dan ook nauwelijks iemand die erover prakkezeerde de oorspronkelijke grasparkiet raszuiver te houden.

Zowel op het Europese vasteland als in Engeland fokte men de grasparkiet aanvankelijk uitsluitend op kleur. In Engeland kwam hierin aan het begin van de vorige eeuw verandering toen een groepje grasparkietfokkers de standaard van uitmuntendheid ontwierp en zich ging toeleggen op het fokken van postuurvogels. In Nederland bleef men de kleur fok nog een tijd trouw en het duurde nog tot de tweede helft van de vijftiger jaren van de vorige eeuw tot hierin verandering kwam en men schoorvoetend begon het Engelse systeem over te nemen, waarbij de nadruk op de grootte en het in de standaard beschreven type kwam te liggen.

Bij het streven naar steeds forsere grasparkieten waarbij de natuurlijke selectie grotendeels was uitgeschakeld, restte praktisch alleen de schiftende hand van de fokker, die – als dat zo in zijn kraam te pas kwam – zelfs biologisch negatieve afwijkingen aanvaardde of op de koop toe nam.

Op zaterdag 20 januari 2007 bestaan we 60 jaar.

Die dag willen we nog steeds iets speciaals doen, we hebben er tenslotte voor gespaard. Geef uw suggesties voor het invullen van die jubileumdag aub door aan het bestuur.

Prijzenkast

Via via hebben we een heel mooie prijzenkast gekregen. Het bestuur beraadt zich nog hoe we deze zullen gaan gebruiken. Ook hiervoor zijn ideeën altijd welkom.

Advertenties

Voor onze catalogus hebben we straks weer een aantal nieuwe advertenties nodig. Weet u iemand of een bedrijf die in ons blad wil adverteren?

Neem dan even contact op met Jan Middelkoop

Open wedstrijd speciaalclub

Voor de kwekers van exoten en parkieten geldt dat zij zich tot 25 september in kunnen schrijven voor de show van de speciaalclub in Heeswijk Dinther. Het wedstrijd secretariaat is gevestigd op het welbekende adres aan de Otto van Reesweg 45. Inschrijfformulieren zijn tot en met de ledenavond van 19 september beschikbaar. Voor vervoer van de vogels van en naar de TT-zaal kan worden gezorgd.

Ringen

De eerste ringenbestellingen zijn al onderweg naar de fabriek. Deze ringen worden rond 1 oktober verwacht. Als u tijdens de ledenavond van 19 september bestelt mag u (gelet op de levertijd van 8 weken) uw ringen met de prijsuitreiking bestellen.

Midden in het clubblad treft u het ringenstelformulier met de prijzen van de verschillende ringen aan.

Nog een reden om 19 september te komen.

Beterschap

Op het moment van schrijven ligt onze penningmeester Jaap van Driel in het ziekenhuis.

We wensen hem allen van harte beterschap en hopen dat hij weer gauw thuis zal zijn!



F.p. cyanophanes:

Deze ondersoort leeft volledig gescheiden van de andere soorten in Noord Colombia ten oosten van het Santa Marta gebergte. Van deze ondersoort hebben de mannetjes meer donkerblauw op de vleugeldekveren, waardoor -zelfs op de gesloten vleugel een donker-blauwe vlek zichtbaar is.

De poppen zijn niet te onderscheiden van de nominaatvorm

F.p. deliciosus:

De ondersoort waar het om gaat is de hiernaast afgebeelde ondersoort, die leeft in Noord Brazilië in het Amazone-gebied aan beide kanten van de Amazone tot ongeveer de Manaus en de Madeire rivier. Zij behoort tot de kleinste Forpussen, is ongeveer 8 cm lang en weegt gemiddeld 20 gram. De mannetjes hebben een turkoois zweem over de romp en de vleugels zijn meer uitgesproken turkoois dan kobalt.



De poppen hebben een smalle, gele band vlak boven de washuid boven de bek.

Meer informatie over forpussen is te vinden op de website van de speciaalclub: www.speciaalclub.nl en op de website van de forpussenclub

Ringen ruilen

Ook in 2006 hadden weer enkele van onze kwekers een bepaalde ringmaat te kort en hadden andere kwekers die ringen juist weer over.

Voor 1 juli zijn de onderstaande verschuivingen aan het bestuur gemeld: deze vogels mogen dus als EK meedoen **alleen op onze eigen tentoonstelling**.

Harry Hommelenberg 1821 gebruikt de ringen van Bart Hommelenberg 3820 2.7 1 t/m 25 en 2.9 1 t/m 25

Van Jan Middelkoop 7430 naar E. Wesseling 4.5 mm 58-59-60.

Van Peter Meijer 721 ringmaat 2.7 mm naar Rianne Meijer de nrs 1 t/m 10 en naar Matthe van den Beek de nrs 50 t/m 59 en 70 t/m 79.

Inmiddels zijn we zover dat we grasparkieten gecreëerd hebben die in de vrije wildbaan nog geen dag zouden overleven.

Het meest jammerlijke is nog dat de sierlijke en pijlsnelle vlieger die we uit de wildbaan kennen en dit allemaal met zich liet doen thans door meer dan 99,9% van de grasparkietfokkers wordt miskend.

Gelukkig komt hierin nu verandering. Een kleine groep enthousiaste grasparkietliefhebbers hebben de koppen bij elkaar gestoken en zich als groep onder de benaming “Bush Budgie Breeders” (BBB) verenigd met als voornaamste doelstelling de grasparkiet in zijn oorspronkelijke staat terug te fokken. Dat er - tot het zover is - nog een lange, moeizame weg te gaan is, zal duidelijk zijn. Het is echter ook een enorme uitdaging voor de deelnemers aan dit project.

Grasparkietliefhebbers die zich ook voor dit project interesseren, verwijs ik naar de website van de groep: www.Bush-Budgies.net

In *Zoology of New Holland* (1793) noemt de Engelse veldbioloog George Shaw die de grasparkiet ontdekte, zijn ontdekking ‘Undulated Parakeet’ en geeft hem de wetenschappelijke naam *Psittacus undulatus*. Vervolgens beschrijft Shaw in 1805 de grasparkiet in zijn oorspronkelijke vorm als volgt: “De grasparkiet behoort tot de kleinere papegaaien, doch zijn lange staart doet hem groter lijken dan hij in werkelijkheid is. Zijn lengte bedraagt 20 tot 22 cm, zijn spanwijdte 26 tot 27, de vleugellengte 9, de staartlengte bijna 10 cm. Zijn gestalte is zeer sierlijk, het lichaam slank, de snavel hoger dan lang, aan de zijden en aan de bovenkant afgerond, de bovensnavel bijna loodrecht naar beneden gebogen, de onderkant diep ingekerfd vervolgens tot een spits versmald ver reikend tot over de ondersnavel, de laatste even hoog als de bovensnavel en aan de voorkant boven afgerond; de poten zijn dun, slank en naar verhouding hoog en voorzien van lange tenen en nagels, de vleugels lang en spits toelopend, van de slagpennen de tweede pen het langste, de vleugelpunt bijna even lang als het bovendee van de vleugel, de lange staart waarvan de beide middelste veren ver voorbij de andere uitsteken, trapvormig, zodat het buitenste paar slechts een derde deel is van de lengte der middelste, de bevedering buitengewoon zacht en zeer sprekend getekend, naar geslacht nauwelijks, naar leeftijd weinig verschillend.



Voorhoofd, bovenkop, teugels en de streek rond de ondersnavel zijn zwavelgeel, aan weerszijden begrensd en versierd met elk vier, zich aan de top van verlengde veertjes bevindende diepblauwe vlekken, waarvan die op de wangen zit de grootste is, terwijl de drie overige er uitzien als ronde stippen; oorstreek, achterkop, nek, mantel, schouders en het grootste deel van de vleugeldekveren hebben een groenachtig gele kleur, elke veer echter is voorzien van vier smalle, op de schouders en vleugeldekveren van

twee bredere zwarte dwarsbanden; onderrug, stuit en bovenstaartdekveren alsmede de onderzijde vanaf de kin zijn prachtig grasgroen, de handpennen en de dekveren hiervan dof groen, aan de buitenzijde smal geel, aan de binnenzijde zwartachtig gezoomd, in het midden met brede wigvormige geelachtige vlekken getekend, de armpennen aan de buitenzijde groen, smal geelachtig gerand, binnenzijde geel, aan de basis zwartachtig, de laatste armpennen en de laatste schouderveren bruinzwart met brede, gele eindzoom, de beide lansvormige veren van de staart dof donkerblauw, de overige stuurpennen groenblauw met in het midden een brede, citroengele vlek welke zich over beide vlaggen van de veer uitstrekt, en brede zwarte zomen aan de basis van de binnenvlaggen. Het oog is bleekgeel, de snavel hoorngeel, aan de basis groenachtig grauw, de washuid donkerblauw en de poot blauwachtig groen. Het iets kleinere wijfje onderscheidt zich van het mannetje doordat de keelvlekken niet helemaal zo groot zijn en de washuid als regel grauwgroen gekleurd is.”

Vergelijken we bovenstaande beschrijving met het beeld dat we thans van de oorspronkelijke wildvorm hebben, dan wijkt de beschrijving die Shaw ruim 200 jaar geleden van de grasparkiet maakte op slechts één onderdeel wezenlijk af.

bebroed, komen na 19-22 dagen uit. De man zal in de onmiddellijke nabijheid, vaak naast de nestingang, de wacht betrekken en een waarschuwend gefluit laten horen als hij onraad bespeurt. De pop komt gewoonlijk binnen enkele tellen dan poolshoogte nemen. Meerdere broedsels per seizoen zijn heel wel mogelijk.

Bij de Groenstuitdwergpapegaai gaat het om één der kleinste soorten. Gemiddeld zijn zij zo'n tien centimeter lang en wegen 20 tot 26 gram. Men vindt ze in Guyana, Brazilië, Trinidad, Venezuela en Columbia. Zij komen dus uit de warmste streken van Zuid Amerika. De kleur is glanzend appelgroen en bek en poten zijn hoornkleurig. Deze veer kleur maakt ze praktisch onzichtbaar, zodra zij zich tussen de bladeren van de bomen ophouden.

De Groenstuitdwergpapegaai heeft vier ondersoorten:

- F. passerinus viridissimus,
- F. passerinus cyanochlorus,
- F. passerinus cyanophanes en
- F. passerinus deliciosus.

We hanteren bij de forpussen steeds de wetenschappelijke benamingen voor de ondersoorten en liefst ook voor de soorten zelf. Dat voorkomt misverstanden en helpt om de soorten en ondersoorten raszuiver te houden. Eventuele kleurmutaties dient men naar mijn mening ook uitsluitend tot de nominaat vorm te beperken.

Forpus passerinus passerinus

Bij de mannetjes zijn de grote vleugeldekveren kobaltkleurig en de kleine vleugeldekveren turkoois. Stuit en romp zijn emeraldgroen. De poppen hebben noch kobalt noch turkoois maar wel een weinig geel tussen de ogen, vlak boven de washuid.

F.p. viridissimus:

Deze ondersoort is de grootste Groenstuit en kan tot 28 gram wegen. Zij is donkerder groen dan de nominaatvorm. De mannetjes vertonen meer kobalt dan turkoois op de vleugels De poppen meer geel in het masker dat soms uitloopt tot het voorhoofd en de wangen.

F.p. cyanochlorus:

Over deze ondersoort is weinig informatie. Zijn biotoop is gesitueerd in Noord Brazilië vlak bij de grens met Suriname. De mannetjes verschillen weinig van de nominaatvorm en de poppen zijn meer uitgesproken geelgroen.



Groenstuit forpussen

Tijdens de opleidingsdag van augustus bracht voor de behandeling van de Zuid_Amerikaanse soorten een van mijn medecursisten een koppel “groenstuitjes” mee. Na veel wikken en vergelijken van de verschillende beschrijvingen kwamen aspirant keurmeesters en docenten tenslotte tot de conclusie dat we te maken hadden met de *Forpus passerinus deliciosus*. Omdat de collega geen plek voor hem had en ik nog wel een broedkooi leeg had staan gingen ze met mij mee naar huis. Een reden om me nog eens extra in deze ondersoort te verdiepen.

Wat de agaporniden voor Afrika zijn, zijn de forpusdwergpapegaaien voor ZuidAmerika. Het zijn kleine, ietwat gedrongen vogels met korte, wigvormige staartjes, lange snavels en met doorgaans blauw in de vleugels. Ze zijn 12-14 cm groot, vliegen door de lange vleugels erg goed en leven dan ook aan de randen van bossen in soms verrassend grote groepen bij elkaar. Ze voeden zich met zaden, zachte vruchten en bessen en soms wat insecten. De diertjes broeden in holten van bomen en dikke takken en broeden daar 3-7 eieren, soms zelfs meer, tot 9, in uit. De meeste vogels die aangeboden worden zijn schuw en moeten dan ook met zorg worden behandeld in een rustige omgeving met kamertemperatuur. In Nederland gefokte exemplaren echter - en de mogelijkheden voor een goede kweek zijn er zeer zeker - zijn sterk en aanhankelijk. We voeden de dieren met witzaad, millet, trosgierst, gebroken haver, de kleine soort zonnebloempitten, zilvergierst, stukjes zoete appel, paardebloemen, vijgen, mierik (muur), geweekt wittebrood of beschuit, samen met stukjes hard gekookt ei en een vertrouwd merk universeelvoer en insectenopfokvoer. Wees erop voorbereid, dat deze vogels grote eters én snoepers zijn! Met de hand grootgebrachte vogels zijn ideale speelkameraadjes. In zowel een kooi als in een volière is een spannetje zeker op zijn plaats. Worden ze in een kooi gehouden, dan moet deze zeker een lengte van 60 cm hebben. Grasparkietenbroedblokken e.d. kunnen ingeschakeld worden als de aviculturist er zeker van is een paartje te bezitten. De nestkom voorzien we van wat zaagsel of turfmoel. Verder verstrekken we wilge en fruitboomtakken, waar de vogels de schors van afpellen en dit voor de kraamkamer gebruiken. De pop legt ook in gevangenschap soms een groot aantal eieren, om de 35-48 uur één! De eieren, die alleen door de pop worden



De ronde keelstippen zijn immers niet diepblauw maar zwart. Kennelijk heeft Shaw hier niet goed gekeken of het niet goed opgeschreven.

Ter verduidelijking nog een opmerking bij de door Shaw opgegeven lengtemaat van 20 tot 22 cm. Shaw bedoelde hier te zeggen de lengte gemeten vanaf de snavelpunt via de schedel tot aan het uiteinde van de staart en niet, zoals men thans de lengtemaat van de vogels aangeeft, van kruin tot staartuiteinde. Met de thans toegepaste meetmethodiek komt men dan uit op een lengte van ongeveer 19 cm. Het gewicht van de volwassen grasparkiet in de vrije natuur varieert voor de mannen van 26 tot 29, voor de poppen van 27-29 gram.

Gelet op de gedetailleerdheid van Shaw's soortbeschrijving hanteert de BBB-groep deze als leidraad voor de verwezenlijking van haar doelstelling: het weer terugbrengen van de grasparkiet in zijn oorspronkelijke vorm.

Het leven van de grasparkiet in de vrije natuur

Was het Shaw die de eerste beschrijving gaf van de grasparkiet, aan de beroemde natuurhistoricus John Gould komt de eer toe de eerste te zijn geweest die iets over het leven van de vogel in de vrije natuur op papier heeft gezet. Hieraan zijn later door andere auteurs die het leven en de gewoonten van de grasparkiet in de wildbaan hebben bestudeerd maar weinig nieuwe feiten toegevoegd. Het is ook Gould geweest die de wetenschappelijke naam, die Shaw oorspronkelijk aan de grasparkiet gaf, omdoopte in *Melopsittacus undulatus*.

Tegenwoordig weten we dat de grasparkiet bijna over het gehele Australische continent is verspreid en eigenlijk alleen de kuststreken en dichte bosgebieden mijdt. Ook op het eiland Tasmanië komt hij niet voor). Grasparkieten zijn typische bewoners van de binnenlandse savannen en halfwoestijnen, waar uitgestrekte grasvlakten en boomgroepen elkaar afwisselen. Met voorliefde houden ze zich echter op langs de met eucalyptusbomen begroeide waterlopen en aan de oevers van meren en plassen, die eveneens bijna altijd begroeid zijn met metershoge eucalyptusbomen. Het zijn vooral deze bomen met hun spaarzame bladkronen en talrijke holten waarin de grasparkiet schuil- en nestgelegenheid vindt. Grasparkieten zijn uitgesproken kolonievogels die een trekkend bestaan leiden. De trekrichting en de groeps grootte worden bepaald door het voorhanden zijn van water en het aanbod van graszaden, waarmee hij zich voornamelijk voedt en zijn jongen grootbrengt. Onder min of meer normale omstandigheden leven grasparkieten in groepen van 10 tot 50 stuks. Tijdens lange periodes van droogte,

ondernemen de vogels verre vluchten op zoek naar water en verzamelen zich uiteindelijk bij de laatst overgebleven drinkplaatsen. Hierbij ontstaan dan menigmaal enorme vluchten van honderdduizenden grasparkieten, die een indrukwekkend schouwspel vormen.

Wat de voortplanting betreft richt de grasparkiet zich uitsluitend op de regenval. Dit heeft te maken met het feit dat hij voor het grootbrengen van zijn jongen aangewezen is op halfrijpe gras- en onkruidzaden, die er alleen dan zijn, wanneer er overvloedig regen valt. Komen ze tijdens hun omzwervingen in een gebied waar het pas geregend heeft, dan beginnen ze daar te broeden. Ze blijven op een bepaalde plaats zolang er water en voldoende voedsel is en brengen als de omstandigheden erg gunstig zijn vaak verschillende nesten achter elkaar groot. Zodra de voedselvoorraden opraken of er een tekort aan water dreigt, krijgt hun zwerflust weer de overhand en trekken ze verder; de voortplantingscyclus begint dan vaak honderden kilometers verderop weer



opnieuw.

Hoewel zich deze vogels in principe in alle windstreken van het continent kunnen voortplanten en ook qua broedtijd niet aan bepaalde maanden van het jaar zijn gebonden, liggen de voornaamste broedplaatsen van de grasparkiet in het zuidoosten en het zuidwesten van Australië. Als hier na een natte winter ook in het voorjaar, dus eind september en in oktober, nog veel regen valt, dan schiet het gras uit de grond en ontwikkelt zich tot formidabele hoogte. Onder invloed van de warme voorjaarszon ontwikkelt zich de bloei erg snel en niet lang daarna dragen de aren zaden en vindt de grasparkiet hier een rijk gedekte tafel.

Zodra de dagtemperatuur stijgt tot boven de 30 graden Celsius en er geen regen valt, veelal in de maanden november en december, sterft de plantengroei snel af en loopt de broedperiode ten einde. In sommige jaren als de herfstregens zeer vroeg aanvangen, wordt wel eens opnieuw met broeden begonnen totdat de invallende winter ook aan deze tweede broedperiode een einde maakt.

In de jaren dat de neerslag in het zuiden belangrijk beneden het gemiddelde blijft, trekken de vogels naar het binnenland of naar het noorden aldoor op zoek naar gebieden met de beste levensvoorwaarden.

Tip ons wie dergelijke soorten bezit en kweekt, dan kunnen ook wij contact zoeken. Ook tips over informatie op internet kunt u ons mailen, advertenties van het te koop aanbieden van deze gekweekte vogels, en catalogussen waar deze zijn, of straks worden tentoongesteld. Wij verwachten dat u dit bericht serieus neemt, en ons gaat helpen aan al deze informatie. Anders is het straks voor veel soorten misschien vijf voor twaalf, en kunnen we die in de toekomst mogelijk niet meer houden. Werk hier aan mee in het belang van onze hobby.

Als wij ons al de voorbije jaren al niet hadden ingespannen, hadden we nu misschien alleen nog maar een grasparkiet en een kanarie in onze kooien gehad.

Wij zien graag al uw informatie tegemoet, en zullen als Algemene Nederlandse Bond van Vogelhouders er alles aan doen om de overheid, en andere instanties er van te overtuigen dat we in Nederland vele goede en deskundige vogelliefhebbers hebben, die ook bijzondere vogels kunnen houden en kweken.

Alle informatie graag naar: Bart Braam, Keiendriesstraat 20, 6685 AL Haalderen, 0481-462507, E-mail: bartbraam@planet.nl

Te koop aangeboden.

Joop de Rooij heeft al zijn vogels op moeten ruimen en biedt daarom zeven bijna nieuwe en volledig complete TT-kooien aan voor € 40,--.

Neem svp even telefonisch contact met hem op: 0343 576659.

Zijn adres is: KAREL de GROTESTRAAT 26/16 , 3962 CL, Wijk bij Duurstede

Webruimte gevraagd

Voor het op internet plaatsen van vogelinformatie en onze clubbladen is nogal wat ruimte nodig. Bij elk email-adres wordt ook gratis ruimte voor een eigen website bijgeleverd, die lang niet iedereen (volledig) gebruikt. Heeft u nog ruimte over die wij mogen gebruiken geef het dan svp door aan de redactie.

Dat voorkomt dat wij als vereniging zelf dure ruimte bij moeten huren.

The logo for 'brilmode' consists of the word 'brilmode' in a bold, lowercase, sans-serif font. The text is centered within a grey, rounded rectangular frame that has a slight 3D effect with a darker grey shadow on the right side.

BRILLEN - CONTACTLENZEN - HOORTOESTELLEN
Chopinplein 1a Culemborg Tel : 0345-513112

Bijzondere kweekresultaten MELDEN

BIJZONDERE VOGELS KWEKEN IN DE TOEKOMST HOE LANG NOG??

Al vele jaren is men binnen allerlei instanties en de overheid bezig om tot een verdere invulling te komen van de Flora en Faunawet, en de gezondheids en Welzijnswet voor dieren. Dit jaar is de discussie weer op gang gekomen, over wat wel of niet mag in de toekomst.

Onze bondsvoorzitter Pierre Stijnen die plaats heeft binnen het forum van de Raad voor dierenaangelegenheden, en onze secretaris Bart Braam steken hierin veel tijd en energie die zich zal moeten vertalen in het belang van onze hobby.

Op dit moment wordt er op aandringen der tweede kamer weer gewerkt aan een soort negatieflijst. Deze lijst zal straks moeten aangeven welke dieren we wel en niet mogen houden.

Op het gebied van de vogels zijn we al enkele jaren bezig, om hier aan invulling te geven. We kunnen tot heden stellen dat we al veel hebben bereikt, en de meest gangbare soorten voor de toekomst door ons kunnen worden behouden. We willen echter meer, en moeten dus anderen overtuigen.

Er zijn echter nog vele soorten vogels, en dan spreken we over de waarvan we de andere groeperingen moeten overtuigen dat deze wel degelijk zijn te houden door ons als liefhebbers/kwekers. Maar men wil ook overtuigingen dat deze ook worden gekweekt, zowel bij ons, als in onze buurlanden.

Wij vragen u als leden er op attent te maken dat we op korte termijn moeten beschikken over voldoende kweekverslagen, van alle bijzondere soorten vogels. Hiermee kunnen wij dan de tegenpartijen overtuigen.

Wat kunt u doen?

Uw clubbladen waarin verslagen staan van bijzondere kweekresultaten aan Bart Braam toe te sturen. Tijdschriften (ook internationaal) met melding bijzondere kweekresultaten aan ons toezenden. (of Kopie)

Zijn u kwekers bekend met bijzondere soorten vogels, zoals b.v. Kwikstaarten – Hoppen – Vliegenvangers – Toekans –Baardvogels – IJsvogels – Buulbuuls – Neushoornvogels – Koekoeken – Nachtegalen – Timalies – Tangara's - enz: Vrijwel alle bijzondere soorten dus. Tip deze mensen om een verhaal te maken, van het houden van deze vogels, maar in het bijzonder als ze er mee hebben gekweekt. Kunnen zij dit niet dan zijn is uw redactie bereid ze daar mee te helpen. Ook foto's van deze vogels in de volière, en van de kweek zijn zeer welkom.

Al deze middelen kunnen onze bond er in steunen om de andere partijen te overtuigen en zoveel mogelijk soorten veilig te stellen, ook voor het kunnen en mogen houden in de toekomst.

Zoals ik al opmerkte, kiezen grasparkieten hun broedplaats bij voorkeur in holten van dikke takken in hoge eucalyptusbomen.

Ze gebruiken geen enkel nestmateriaal. De pop legt haar eieren op de houtmoolm die zich op de bodem van de holte heeft verzameld. Meestal broeden verschillende koppels in één boom zo dicht mogelijk bij elkaar. Dit



ruim 8000 m2
kamer en
tuinplezier

TUINCENTRUM
Th. v.d. HURK & Zn.
Honddijk 11 Culemborg

tel:0345 512136 fax: 0345 530366

broedgedrag vertonen ze ook als in de directe omtrek genoeg andere geschikte bomen staan.

Het legsel varieert van vier tot zes eieren. Soms worden legfels tot acht eieren aangetroffen. De broedduur is achttien dagen. De pop broedt alleen. De man voert de pop op het nest en houdt haar soms een tijdlang gezelschap. Ongeveer 32 dagen na het uitkomen verlaten de jonge grasparkieten de nestholte. Niet lang daarna zijn ze geheel zelfstandig. De pas uitgevlogen jongen lijken op de ouders, maar zijn duidelijk matter van kleur. Aan weerszijden op de borst is een vage dwarstekening zichtbaar. Het groen van onderrug en stuit toont een vage geelachtige golftekening. De fijne golftekening van de achterkop en nek loopt door tot aan de neusdop. Over het geheel genomen is het zwart van de tekening valer en minder scherp afstekend. De keelstippen ontbreken nog of zijn onduidelijk. De ogen zijn zwart, de oogiris ontbreekt. De snavel is zwartachtig, de neusdop nagenoeg hoornkleurig. De poten zijn bleek blauwachtig grijs. De jeugdruï begint wanneer de jongen ongeveer drie maanden oud zijn en duurt ongeveer een maand. Dat is tevens het tijdstip waarop grasparkieten geslachtsrijp worden.

Tekst: *Harrie van de Linden*

Ringen

Ringen