



De Heus

DIERVOEDERS

Agri-shop

Rijsbosch 17
4112 MB Beusichem
0345-501231
E-mail:
deheus.beusichem@versatel.nl

Openingstijden:

Maandag t/m donderdag	08.00 - 18.00 uur
Vrijdag	08.00 - 20.00 uur
Zaterdag	08.00 - 16.00 uur

Nieuw:

- PAVO & Havens Paardenvoeders
- Cavalor paardenvoeders
- Paardenverzorgingsartikelen
o.a. Oster kammen en borstels
- Carocroc:
Honden- en Kattenvoeders

Januari 2008

e
e
k
e
v



~~Eerste~~ Gulemborgse

~~Kanarie-~~en Exoten Vereniging

Het E.C.K.E.V. - bestuur bestaat uit de volgende personen:

- Voorzitter: H. Rens
Otto van Reesweg 45
4105 AB Culemborg Tel: 0345 – 518326
- Secretaris: J.F.A.Pieters
Merwedestraat 3
4102 GL Culemborg Tel.: 0345 – 520664
- Penningmeester/
ledenadministratie J.M. van Driel
Schoolhof Oost 10,
4105 AS Culemborg Tel.:06-23697060
- 2° Voorzitter: F.W. Stap
Margrietstraat 8,
4116 CR Buren Tel.: 0344 – 571896
- 2° secretaris P.L.A. Winkel
Gandhi 61
4102 HG Culemborg Tel.: 06 - 46076368
- 2° Penningmeester: M. Verlangen
Gandhi 215
4102 HL Culemborg Tel.: 0345 – 517450
- Materiaalbeheer: M.H.G. Hommelberg
Tulpstraat 59
4101 GK Culemborg Tel.: 0345-519371
- Ringencommissaris: Jan Middelkoop
Heinsiusstraat 16
4105 DG Culemborg Tel.: 0345 516997

Voorkom teleurstellingen, dus bestel op tijd. Bij twijfel even een belletje naar Jan.

Redactie clubblad: H. Rens, (e-mail redactie@eckev.nl) en J. Pieters

Omslag Koppel grasparkieten

Website: www.eckev.nl (nieuw!) Informatie: info@eckev.nl

Contributie bedraagt € 27,00 per jaar, te voldoen voor 1 januari van het betreffende jaar. **Opzeggen voor 1 juni resp. 1 december.** Inschrijfgeld voor nieuwe leden bedraagt € 2,00 Bankrekening 31.25.09.294 Rabobank Culemborg t.n.v. penningmeester E.C.K.E.V. Girorekening 3980719



JA, U DAAR!

Uw kwaliteitsschoen verdient het om
vakkundig gerepareerd te worden.

NICO BRON

Herenstraat 19
Culemborg
Tel. 0345 - 513530

een gecertificeerd Meester Schoenmaker



Exotische vogelsoorten uit Zuid-Europa 50 jaar een begrip in Nederland.

Samen met de Vogelbescherming en de Universiteit van Durham heeft SOVON de Klimaatatlas Europese Broedvogels samengesteld. Deze atlas, die zij volgende week in Den Haag presenteren, biedt inzicht in de gevolgen van de klimaatverandering voor 540 Europese vogelsoorten. Ook een groot aantal andere Europese landen presenteert volgende week de atlas.

Leefgebied

De Klimaatatlas geeft volgens vogelonderzoeker Foppen onder meer een beeld van de leefomgeving van vogels over vijftig jaar. Zo zal de in Nederland bekende spotvogel verdwijnen. Daarvoor in de plaats komt de orpheusspotvogel, een nu nog exotische familie uit Zuid-Europa. En de Provençaalse grasmus, die langs de Middellandse Zee leeft, kan over vijftig jaar met gemak tot in Denemarken komen. De vale gier, die bijvoorbeeld in juni vorig jaar al boven Nederland werd gesignaleerd, is volgens Foppen "een speciaal geval". De populatie van de roofvogel, afkomstig uit de Spaanse Pyreneeën, is de laatste jaren "spectaculair gegroeid". Op zoek naar voedsel trekken ze richting het noorden en ook Nederland zal volgens Foppen regelmatig bezoek krijgen van de vale gier.

Spel/ en kaartavond op 19 januari

Eén van de traditionele rondvragen op de jaarvergadering is, wanneer er weer een kaartavond wordt gehouden. Dat wordt dit jaar zelfs voor de jaarvergadering nl al op 19 januari en heeft mede te maken met de vroege Carnaval en Paas en de beperkte beschikbaarheid van de zaal. We gaan dan spelen om mooie prijzen.

We gaan die avond in ieder geval jokers en klaverjassen en bij voldoende animo ook sjoelen. Als u even laat weten of u komt en wat u graag wilt spelen dan kunnen we er al een klein beetje rekening mee houden.

Deelname is voor leden en huisgenoten gratis.

Willen ook kennissen van u meedoen neem dan vooraf even contact op met het bestuur.

Memo

TL-lampen beschikbaar

In samenwerking met Expert Verboom kunnen wij aan onze leden de TL-buizen, die worden gebruikt tijdens de keuring, leveren.

Het typenummer van deze nieuwe buizen is TLD950.

Deze daglichtlampen laten de natuurlijke kleuren van uw vogels het best uitkomen. Er zijn nog enkele lampen beschikbaar tegen een zeer voordelige prijs. De leden die al lampen besteld hebben kunnen ze bij Henk Rens thuis ophalen of anders afhalen op de kaartavond.

Wij feliciteren de prijswinnaars in Zutphen en Apeldoorn. Van het bezoek vindt u een verslag in dit blad.

Op 19 januari is er weer een kaartavond. Alle leden en huisgenoten zijn welkom en deelname is gratis.

In dit blad aandacht aan een paar vogels die in Zutphen zijn gesignaleerd: de Mehringer en de Goudvoorhoofdperkiet. Ook de Swiftperkiet, uitvoerig beschreven in het kerstnummer, was te bewonderen..



Bezoek aan de vogelshows in Zutphen en Apeldoorn

Op zaterdag 5 januari 2008 zijn we met 7 personen in een busje naar de vogelstad Zutphen getoerd. Via internet was al bekend dat de Culemborgse kanaries het goed hadden gedaan. Bram van Velden haalde met zijn stam glosters corona een zilveren medaille en Ad Verwaaij haalde zelfs 2x goud, 1 x zilver en 1x brons met zijn kleurkanaries. Daarnaast waren er natuurlijk nog duizenden andere vogels, die allen het bekijken meer dan waard waren en waarvan de bestudering meerdere uren in beslag neemt. Maar om half drie hadden we het meeste gezien, boodschappen gedaan en mooie vogels gekocht, zodat we gepakt en gezakt weer terugkeerden.

Een week later brachten zes leden een bezoek aan Vogel 2008 in Apeldoorn. Meer vogels, meer standjes en meer bezoekers. Helaas geen Culemborgse prijswinnaars dit keer, maar bij de prijswinnende valkparkieten waren wel vogels die aan de valkparkieten-dag deze zomer hebben deelgenomen.

Voor de reis naar Hasselt op 26 januari hebben zich al een tiental personen aangemeld. De verwachting is dat daar ca 18.000 vogels uit Noord en Zuid Europa zijn te bewonderen. Aanmelden bij Henk Rens kan nog tot en met de Kaart- avond op zaterdag 19 januari. Denkt u wel aan een geldige legitimatie?



Kweek

Als nestgelegenheid hebben Goudvoorhoofdparkieten, net als de meeste aratinga's, een duidelijke voorkeur voor uitgeholde natuurstammen. Toch worden van dik hout gemaakte nestkasten ook wel geaccepteerd door de meeste soorten. Het broedblok dient een bodemoppervlak te hebben van ongeveer 28 x 28 cm. en een hoogte van ca. 60 cm. Het invlieggat dient een doorsnede te hebben van 7 - 8 cm.

Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas en of krammen. Als nestmateriaal dient een mengsel van potgrond en houtspaanders in het blok te worden aangebracht. Ook kan een dik stuk vermolmd hout gegeven worden. Dit wordt dan door de vogels geheel stuk geknaagd waardoor een prima bodembedekking in het nestblok ontstaat. Het broedblok dient het gehele jaar door opgehangen te blijven omdat de vogels er gewoonlijk ook in slapen.

De vogels staan bekend als goede broedvogels.

De vogels beginnen zo rond april, mei met het broedproces. Vroeger komt echter ook voor! Over het algemeen hebben de vogels een voorkeur voor een natuurbroedblok. Het bodemoppervlak van het broedblok dient een afmeting te hebben van ongeveer 28 x 28 cm. en een hoogte van 60 cm. Het invlieggat dient een diameter te hebben van 8 cm. Om de vogels te helpen bij het in- en uit gaan van het blok is het aan te raden de binnenzijde van het blok onder het invlieggat te voorzien van een strookje gaas en of krammen. Als nestmateriaal kan een mengsel van (vochtig) onbemeste potgrond en houtkrullen worden gegeven of een dikke laag vermolmd hout. De pop legt twee tot zes eieren, maar gewoonlijk twee tot vier, die circa 23-24 dagen worden bebroed. De eieren worden om de dag gelegd. De jongen dienen op een leeftijd van 14 dagen te worden geringd met ringmaat 7 mm. Na zeven à acht weken verlaten de jongen het nest. Drie weken na het uitvliegen zijn ze zelfstandig. In veel gevallen broeden de vogels maar 1x per jaar.

Er zijn in Brazilië blauwe en cinnamon mutaties bekend.

Tekst van A. van Kooten bewerkt door Henk Rens



8.000 m² kamer- en tuinplezier

TUINCENTRUM

Th. v.d. HURK & Zn.

Honddijk 11
4101 NP Culemborg
tel. 0345-512136
fax 0345-530366

www.tuincentrumvandenhurk.nl

HET MEEST COMPLETE EN VOORDELIGSTE TUINCENTRUM IN DE REGIO!

ontsnappen van de vogels is het ook van belang dat er volièregaas gebruikt wordt dat voldoende weerstand kan bieden aan de sterke en krachtige snavels van deze parkieten. Een goede keuze in dezen is volièregaas met een afmeting van 19,0 x 19,0 x 1,45 mm. Indien sprake is van meerdere buitenvolières dan dienen deze altijd onderling van elkaar gescheiden te zijn met dubbel gaas tenzij er ondoorzichtige tussenwanden tussen de volières geplaatst zijn die onderling contact onmogelijk maken. Dubbelgaas en ondoorzichtige wanden tussen de buitenvolières voorkomt dat de vogels elkaar door het gaas kunnen verwonden. Met name verwondingen aan de poten, zoals het afbijten van tenen en of nagels, willen onder aratinga's nog wel eens voor komen. De vliegopening die toegang geeft tot het nachtverblijf dient een afmeting te hebben van ongeveer 20 cm. Zorg ervoor dat deze opening af te sluiten is d.m.v. een schuifluikje. Het is het gemakkelijkst als dit schuifluikje te bedienen is aan de voorzijde van de volièere. Het is verstandig om de buitenvolières voor de helft te overdekken, bijvoorbeeld met golfplaten. De vogels hebben op deze manier altijd een droge plaats in de buitenvolièere. Het biedt u tevens de mogelijkheid om in de buitenvolièere broedblokken op te hangen. Het niet beschutte deel van de buitenvolièere geeft de vogels de mogelijkheid om bij regenval een douche te nemen. De vloer van de volièere kan het beste gemaakt worden van beton en of cementtegels. Hierover kan eventueel zand, schelpen of iets anders gestrooid worden.

Voeding

U kunt deze vogels als basisvoer een zaadmengsel voor grote parkieten geven, aangevuld met kleine stukjes fruit en zo nu en dan wat eivoer.

Het zaadmengsel dient aangevuld te worden met een mengsel van 50% eivoer en 50% universeelvoer. Verder is het van belang dagelijks kiemzaad, fruit (o.a. appel, peer), bessen (o.a. rozenbottel, lijsterbes en vuurdoorn) en groenvoer (o.a. wortel en komkommer) te verstrekken. Vers fruit en verse vruchten is voor deze vogel heel belangrijk, dit moet dan ook ongeveer 30% van het totale dagelijkse menu uitmaken. Voor een goede opname van het mengsel van eivoer/universeelvoer kan deze met het kiemzaad vermengd worden. De verhouding tussen het zaad en het geweekte kiemzaad/eivoer/universeelvoermengsel dient ongeveer één op één te zijn. De vogels eten verder graag halfrijpe maïskolven en vers geplukte gras- en onkruidzaden. Dagelijks dienen de vogels de beschikking te hebben over scherpe maagkiezel, oesterschelpen grit en vers drinkwater. In de broedtijd dient naast bovenstaande voeding ongelimiteerd eivoer verstrekt te worden.

Noteert u alvast even in uw agenda?

Soort Vergadering	Datum	Waar/bij Wie	Clubblad
			15-jan
Kaartavond	zaterdag 19 januari	Rode kruisgebouw	17-feb
Ledenvergadering/ jaarvergadering	dinsdag 26 februari	Rode Kruisgebouw	15-mrt
Ledenvergadering	dinsdag 25 maart	Rode Kruisgebouw	12-apr
Ledenvergadering	dinsdag 22 april	Rode Kruis gebouw	16-mei
			15-jun
			15-jul
			15-aug
			10-sep
Ledenvergadering	dinsdag 16 september	Rode Kruisgebouw	4-okt
TT Commissie	dinsdag 7 oktober	Rode Kruisgebouw	
Ledenvergadering/ inschrijf form. Inleveren	dinsdag 14 oktober	Rode Kruis Gebouw	
Bestuursvergadering/ TT Commissie	dinsdag 21 oktober	Henk Rens	25-okt
TT opbouwen	donderdag 6 november	Rode Kruisgebouw	
Tentoonstelling	7-8-en 9 november	Rode Kruisgebouw	22-nov
kaartavond	zaterdag 29 november	Rode kruisgebouw	
Feestelijke prijsuitreiking	zaterdag 13 december	Rode kruisgebouw	24 dec

Suggesties voor de ledenavonden graag tijdig bij de secretaris.

De Mehringer



De Mehringer is een ras die we nog niet zo veel zien op de shows maar hij komt er aan want er zijn steeds meer liefhebbers voor, dit wordt alleen maar meer omdat hij in Duitsland op de C.O.M. voor de eerste keer zijn punten heeft behaald zo dat hij nog twee keer zijn punten moet halen om erkend te worden bij het C.O.M.

In Nederland (ANPV) en Duitsland hebben ze de soort al wel erkend dus je kunt in Nederland gewoon met deze vogel spelen. De Mehringer werd voor het eerst geshowd op de Duitse kampioenswedstrijd van 1989.

De Mehringer is een frisé ras dat ontstaan is door kruisingen tussen kleine parijse frisees, Noord Hollandse frisees, glosters en

kleurkanaries.

De naam Mehringer komt voort uit de woonplaats Mehring van de kweker Karl Franke is de peetvader van de Mehringer.

In Januari 1994 werd de Mehringer in Duitsland gezien als ras.

De grootste moeilijkheid bij de Mehringer is toch wel de grootte die 13 centimeter moet zijn maar meestal toch groter is.

Maar er zijn meer moeilijkheden zoals de kop frisuur die we op het moment minimaal zien al wil ik wel zeggen in het jaar 2000 heb ik ze gezien en zat er helemaal geen frisuur op dus we zijn op de goede weg. Bij de kop frisuur behoort een krachtig volle kop met bakkerbaarden waar ook nog een mooie kraag in de hals moet zitten die de overgang naar het lichaam moet maken.

De Mehringer moet twee goed ontwikkelde volle flanken bezitten die naar de schouders op staan die tevens de breedte maken van de vogel, maar het laatste jaar zag ik dat zo'n negen van de tien of maar één flank had of niet zo goed ontwikkelt was. De borst friseering moet ook goed vol en breed zijn en overlopen in de buikfriseering die er toch ook echt hoort te zitten en niet terug mag vallen.



1. Aratinga aurea aurea
2. Aratinga aurea major

De ondersoort Aratinga aurea major is gelijk aan de nominaatvorm maar qua formaat ongeveer 4 cm. groter. De grootte is dus:

Aratinga aurea aurea - 26 cm.

Aratinga aurea major - 30 cm.

Geslachtsonderscheid

Er zijn geen uiterlijke verschillen tussen een man of pop. Deze vogels dienen dus gesekest te worden.

Sociale eigenschappen

Een uitermate populaire en aangename vogel. Deze vogel is intelligent, verre van luidruchtig, ondanks soms schrill stemgeluid.

Behuizing

De vogel is redelijk vernielzuchtig, het is dus ook aan te raden om ze niet in houten kooien te huisvesten. Tevens is het regelmatig verstrekken van wilgentakken aan te raden. Het houden van Goudvoorhoofdparakieten hoeft geen problemen te geven in ons land. Het zijn over het algemeen sterke vogels. Een belangrijk aspect bij het houden van Aratinga's is dat de meeste soorten elkaar, met name in de broedperiode, niet verdragen. Voor de huisvesting betekent dit dat Aratinga's, paarsgewijs, in aparte rennen gehuisvest moeten worden. Bij de bouw van een volière verdient het aanbeveling de buitenvolière(s) te voorzien van een goed geïsoleerd nachtverblijf. Een goede afmeting voor een buitenvolière is 3 á 4 meter lang, 1 meter breed en 2 meter hoog. Het nachtverblijf dient een afmeting te hebben van 1,5 meter lang, 1 meter breed en 2 meter hoog.

Omdat Goudvoorhoofdparakieten toch wel wat warmtegevoelig zijn dient het nachtverblijf vorstvrij te zijn. Verder is het van belang dat de vogels in de donkere maanden minimaal 12 uur licht krijgen. Gezien de knaaglust van Goudvoorhoofdparakieten kan de buitenvolière het beste gemaakt worden van metaal, bijvoorbeeld aluminium. Vergeet niet een portaal of sluis aan te brengen in de volière. Goudvoorhoofdparakieten zijn over het algemeen vliegensvlug en een portaal of sluis zorgt ervoor dat de vogels in een onbewaakt moment niet kunnen ontsnappen. Met betrekking tot het

Giftige plantendelen: bladeren

Opmerking: accacia is minder giftig in het voorjaar

Clematis (Clematis sp.)

Onderzocht bij: grasparkiet Ziekteverschijnselen: braken

Giftige plantendelen: bladeren

Opmerking: Clematis is minder giftig in het najaar

Dieffenbachia (Dieffenbachia seguine) Onderzocht bij: grasparkiet

Ziekteverschijnselen: irritatie van de slijmvliezen van de bek

Giftige plantendelen: bladeren

bron: dr.H.v.d.Horst, Veldhoven.

Goudvoorhoofdparkiet *Aratinga Aurea Aurea*

Verspreiding

Deze soort heeft één van de grootste verspreidingsgebieden in Zuid-Amerika. De Goudvoorhoofdparkiet leeft in Brazilië, Peru, Bolivia en Argentinië. Ze komen hier zowel paarsgewijs, in kleine groepen als ook in zwermen van 20 tot 50 vogels voor. Ze leven overwegend in open landschappen en droge en halfdroge met boom- en struikbestanden begroeide gebieden. Ook komen ze voor in bewoonde gebieden, parken en tuinen. Regelmatig richten ze schade aan in landbouwgebieden waar ze zich dan tegoed doen aan de aldaar verbouwde landbouwgewassen. In het wild voeden ze zich met verschillende zaden, noten, bessen, vruchten en insecten en hun larven. In de broedperiode zonderen gevormde paren zich af om op zoek te gaan naar een geschikte broedplaats. Ze broeden in holten van bomen en takken maar ook wel in nesten van boomtermieten.

Beschrijving

Donkergroen aan de bovenzijde en lichtgroen van onder, soms olijfgroen, vooral op de borst. Voorhoofd, gedeeltelijk de kruin en de veren rondom het oog oranje. Het verdere gedeelte van de kruin is blauwgroen. Wangen en keel donker olijfgroengeel. Vleugels blauwachtig met zwarte toppen. Groene staart met blauwe toppen; de onderkant van de staart is geelgroen. Zwarte snavel.


De Goudvoorhoofdparkiet kent de volgende ondersoorten:

Standaardschrijving Mehringer

De Mehringer is dus een miniatuur Parijse fris , die in 1989 voor het eerst op de Duitse kampioenswedstrijden te zien was. Het voornaamste onderdeel bij deze vogel is zijn grootte deze mag maximaal 13 cm zijn

De rugkrulling moet overvloedig aanwezig zijn evenals het boeket.

Borstkrulling naar het midden van de borst krullend, ook de buik moet gefriseerd zijn. De flanken die boven het dijbeen beginnen moeten volumineus, breed, symmetrisch opwaarts krullen.



De kop moet breed zijn en voorzien van krachtige frisering, bakkebaarden en collerette moeten aanwezig zijn. De bevedering moet overvloedig zijn, alle kleuren incl. bont zijn toegestaan.

De staart is gesloten maar wel breed, de haneveren moeten aanwezig zijn. De poten zijn kort, de dijnen goed bevederd, de aanzet tot krulling van de nagels moet te zien zijn. De vogel moet een opgerichte houding hebben

Grootte 20 punten

Niet groter dan 13 centimeter

Borst- en buikkruilveren 15 punten

Borst breed, met veren die symmetrisch naar het midden draaien en elkaar raken. Ook moet de buik krullende veren bezitten en niet terugvallen.

Flankkruilveren 15 punten

De flanken die zich boven de dijnen bevinden, moeten veel volume bezitten en breed zijn, en symmetrisch naar boven krullen.

Mantel 15 punten

De mantel moet overvloedig zijn en moet met een zo lang mogelijke scheiding in twee gelijke delen langs het lichaam afhangen. Het boeket moet als een afsluiting van de mantel aanwezig zijn, dit bestaat uit zachte veren die rechts en links van de rug scheiding kan vallen.

Kop en hals 10 punten

Goede volle en krachtige gefriseerde kop, kop grote in verhouding met het lichaam. Bakkerbaarden moeten aanwezig zijn. De hals moet een duidelijke kraag tonen bij de overgang naar het lichaam.

Houding 5 punten

Opgerichte houding, kop, rug en staart in een rechte lijn.

Bevedering 5 punten

Regelmatig en zijdeachtig, overvloedig op de krullende delen.

Staart en hanenveren 5 punten

Lang, breed en gesloten, hanenveren moeten aanwezig zijn.


Poten 5 punten

Poten zijn kort met goed bevederde dij, krulling van de nagels moet waarneembaar zijn.

Conditie 5 punten

Gezond zuiver en goed verzorgd. Alle kleuren en bond is toegestaan. Zo als je ziet is het zeker geen makkelijke uitdaging om een goede te kweken laat staan er één te kopen maar je moet roeien met de riemen die je hebt en dat maakt de uitdaging nog interessanter. Het is een kwestie van selecteren en onderling wat ruilen of kijken of je wat tegen komt bij een opkoper of op een beurs.

Wat de kweek betreft moet ik zeggen dat het over het algemeen wel goed gaat. Het beste is ze koppels gewijs in de broeikooien te zetten en dan zijn er niet zo veel problemen te verwachten bij deze vogel en het advies ring maat is 2,9. Ze worden geshowd in een koepel kooi met zitstokken van 12mm.



LEKHAVEN B.V.
Tel. (0343) 430293

BOUWSTOFFENHANDEL
& OVERSLAGBEDRIJF

- ZAND
- GRIND
- SIER GRIND
- GEBROKEN PUIN
- BIG BAGS
- CEMENT
- CONTAINERVERHUUR

Oleander (Nerium oleander) Onderzocht bij: grasparkiet

Ziekteverschijnselen: sloomheid, diarree, zwakte, krampen, speekselen, braken, soms sterfte

Giftige plantendelen: bladeren

Opmerking: Oleander is giftig in het voorjaar, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten

Philodendron (Philodendron scandens) Onderzocht bij: grasparkiet, amazone

Ziekteverschijnselen: kokhalzen, braken, diarree, sterfte zeer sporadisch (bij dieren die veel plantenmateriaal opeten)

Giftige plantendelen: bladeren, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten

Rhododendron (Rhododendron simsii / indicum)

Onderzocht bij: grasparkiet Ziekteverschijnselen: zwakte, sloomheid, kokhalzen, braken, pasteuze ontlasting, sterfte zeer sporadisch

Giftige plantendelen: bladeren, maar alleen als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten

Avocado (Persea sp.)

Onderzocht bij: grasparkiet, grijze roodstaart

Ziekteverschijnselen: niet meer op stok kunnen zitten, stoppen met eten, bol zitten, aan veren peuteren en trekken, benauwdheid, zwelling van de borstspieren door oedeem en bleke streping van de spieren, sterfte

Giftige plantendelen: bladeren, vruchten Opmerking: de verschijnselen kunnen sterk wisselen en treden soms pas 24 uur na consumptie op

Sommige soorten wikke (Vicia sp.)

Onderzocht bij: grasparkiet, valkparkiet, agapornis

Ziekteverschijnselen: krampen, spasmen, epileptische aanvallen, sterfte

Giftige plantendelen: bladeren

Taxus (Taxus media) Onderzocht bij: grasparkiet

Ziekteverschijnselen: happen naar lucht, braken, moeilijk op stok kunnen zitten, benauwdheid, bewegingsstoornissen, een enkel dier sterft

Giftige plantendelen: bladeren en vruchtjes

Opmerking: Taxus is in de herfst giftiger

Wingerd of wilde wijn (Parthenocissu quinquefolio) Onderzocht bij: grasparkiet

Ziekteverschijnselen: sloomheid, braken

Giftige plantendelen: bladeren

Opmerking: in het voorjaar is Virginia creeper minder giftig

Gewonde accacia (Robinia pseudoacacia) Onderzocht bij: grasparkiet

Ziekteverschijnselen: loze kauwbewegingen maken, benauwdheid, niezen, hoesten, braken

'Een vlier hoeft je niet te zien bloeien, die ruik je gewoon!' De zware, friszoetige geur is vooral op warme dagen goed te ruiken. Zijn de bloemen helemaal open, dan is het tijd om ze te oogsten. Van de (gedroogde) bloemen kan een bloesemthee worden gezet of er kan onder andere vlierbloesemmelk of vlierbloesemsiroop van worden gemaakt.



Veel schermen, een rijke oogst



Rijpe bessen zijn diep paarsblauw

Worden de bloemen aan de struik gelaten, dan komen er in september - oktober diep blauwpaarse bessen te voorschijn. Wie wel eens zo'n besje uit het scherm heeft geplukt en geproefd, griezelt waarschijnlijk voor de rest van z'n leven en zal niet gauw nog eens zo'n bes willen proeven. De bitterzoete smaak van de bes kan dus niet iedereen bekoren. Maar vergist u zich niet. Wanneer de bessen op de juiste wijze worden bereid, kunnen er verrassende dingen ontstaan. Pluk de bessen pas als ze helemaal rijp zijn. Ze zijn dan zacht en hebben de neiging van het scherm af te vallen. Onrijpe bessen zijn licht giftig en kunnen (bij kinderen) diarree veroorzaken.

Welke planten hebben welke uitwerking?

Lelietjes van Dalen (*Convallaria majali*) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: zwakte, sloomheid, diarree, braken
Giftige plantendelen: bladeren
Opmerking: alleen giftig als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten

Euphorbia of **wolfsmelk** (*Euphorbia pulcherrima*) Onderzocht bij: grasparkiet
Ziekteverschijnselen: soms wat diarree, soms wat roodkleuring van de ontlasting
Giftige plantendelen: rode bladeren
Opmerking: alleen giftig als het in grote hoeveelheden wordt opgegeten

Giftige plantenlijst

Een goed beplante voliere is een leuk aanzien en komt het welzijn en het natuurlijk gedrag van de vogels ten goede. Sommige struiken zoals bv de vlier kan je in de volieres planten en andere beter niet. De gewone vlier (*Sambucus nigra*) onbrak vroeger op geen enkel boerenerf. Bij huis, stal of bakkeet werd de vlier aangeplant als was het een buitengewoon sierlijke plant. Niet de schoonheid van deze struik was de ware reden, maar het bijgeloof dat de struikbescherming zou bieden tegen onweer en kwalijke ziekten.

De hardnekkigheid waarmee de vlier zich handhaaft en vermeerdert, is tegelijkertijd z'n ondergang geworden; door velen wordt hij als ongewenst (onkruid) beschouwd. Jammer, want van de vlierbloesem en -bessen zijn lekkere dingen te maken.

Stikstofrijk

Vlieren komen in Nederland vooral voor op vochtige en stikstofrijke gronden. Van nature vergezellen ze bomen en struiken van het *Populetalia* en *Prunetalia*. De verspreiding vindt vooral plaats door vogels. De onverteerde pitten worden her en der gedropt via de uitwerpselen. Zijn de zaden eenmaal in een geschikt milieu beland, dan kan een ware plaag aan vlierstruiken ontstaan, die nauwelijks meer is te stuiten. De vlier heeft de nare eigenschap alles te verstikken, zodat er niets, maar dan ook niets onder wil groeien. Vooral de nabijheid van een kippenren is een geliefd vestigingsplaatsje. En als u nog een geschikte struik zoekt voor de volière, dan is de vlier er één die het lang uithoudt.

Bloem en bes, daar gaat het om

Zoals gezegd, is de vlier nou niet bepaald een fraaie sierstruik die je gewoon 'moet' hebben. Het is meer een 'fruitboom', die genoeg neemt met een plekje achteraf; bij de composthoop of een vochtig plekje bij het schuurtje. En als er geen plaats voor een vlier meer is in de tuin, gaat-ie gewoon ergens op zoek in het landschap.

Toch bestaan er ook een fraaie, decoratieve soorten van de vlier: de bergvlier, *Sambucus racemosa*, die mooi donkergroen en diep ingezaagd blad heeft, en een bonte variëteit ervan: *Sambucus racemosa* 'Plumosa Aurea'. De bloemen en bessen van de bergvlier lenen zich echter niet voor consumptie.

De gewone vlier bloeit in mei tot in begin juni met witte, breed handvormige, platte schermen.

Ringen formulier

Ringenformulier